




la solution prix/performance

► Des points forts...

- Efficacité sur la germination des spores et l'elongation des mycélium
- Rovral WG s'utilise préférentiellement aux stades B, C ou D



- Solution technico-économique sans influence sur la vinification et la dégustation
- Le seul imide cyclique
- Formulation WG
- 1 bidon pour 1 ha



► Lutter contre le botrytis : un investissement rentable !

► ... des bénéfices pour vous !

- Pour éviter les pertes de récolte
- Solution d'alternance pour la bonne gestion du programme
- Mise en oeuvre facile
- Limite les surcoûts à la récolte (tri)
- Belle capacité d'exportations des vins
- Investissement justifié

ECObot...



FICHE D'IDENTITÉ

- **Rovral® WG** : marque déposée BASF.
- **Autorisation de vente n°** : 2090005.
- **Composition** : 750 g/kg iprodione.
- **Famille chimique** : dicarboximides.
- **Formulation** : granulés dispersables (WG).
- **Conditionnement** : bidon 1 kg.
- **Usage et dose autorisés sur vigne** : **botrytis** - 1 kg/ha (1 application/saison) ; autres usages : consulter le site internet BASF Agro
- **Classement toxicologique** : N : dangereux pour l'environnement – Xn : nocif – R36 : irritant pour les yeux – R40 : effet cancérogène suspecté : preuves insuffisantes – R50/53 : très毒ique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- **Délai d'emploi avant récolte** : 21 jours.
- **Limite maximale de résidus** : **raisins** : 10 mg/kg.
- **Zone non traitée** : 5 m.
- **Délai de rentrée** : 24 h.
- **Protection utilisateur lors de la préparation de la bouillie** : gants en nitrile ou néoprène (EN374), lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4. Dangereux – Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi.

Pour lutter contre le botrytis, ne pas négliger les mesures prophylactiques :

- Limiter la vigueur de la vigne (limitation des apports d'azote, enherbement)
- Bien aérer les grappes (taille, mode de palissage, effeuillage, éclaircissement...)
- Limiter tous problèmes de perforation des baies (Vers de grappe, oïdium, blessures diverses)
- Assurer une pulvérisation de qualité dans la zone des grappes

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | 1 ► Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé. | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 2 ► Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi. | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 3 ► Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes). | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 4 ► Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application. | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 5 ► Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse). | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 6 ► Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor. | <input checked="" type="checkbox"/> |


PENDANT L'APPLICATION

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | 7 ► Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments. | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|---|-------------------------------------|

APRÈS L'APPLICATION

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
|  | 8 ► Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle. | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 9 ► Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche. | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | 10 ► Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande le procédé Osmofilm® | <input checked="" type="checkbox"/> |
- © Marque déposée Sté PANTEK France

Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	 N°Azur 0 810 02 30 33 <small>PRE APPEL LOCAL</small> ou www.agro.bASF.fr
Une question de santé	MSA	 Signalez-nous les symptômes  N° Vert 0 800 887 887
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	 N°Azur 0 810 12 18 85 <small>PRE APPEL LOCAL</small> ou www.adivalor.fr



Anti-botrytis

www.invinoveritas-bASF.com

 **BASF**
The Chemical Company

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI