

# Stroby® DF *beaucoup plus qu'un excellent anti-oïdium*

## ▣ Des points forts...

- **Puissance d'efficacité** des strobilurines
- **Forme un voile protecteur** qui procure une couverture uniforme et une protection régulière



- **Forte liaison lipophile**, d'où son excellente résistance au lessivage
- **Dose et cadence modulables**
- **Également homologué sur excoriose, black-rot et brenner**



Excoriose



Black-rot



Brenner

- **Homologué pour 14 jours de protection**
- **Formulation WG** : pratique et sans poussière

## Stroby® DF

### La solution gagnante contre l'oïdium



## ▣ ... des bénéfices pour vous !

**Puissant  
Polyvalent  
Pratique**

- **Une protection de haut niveau**
- **Sécurise** l'efficacité de votre programme
- **Particulièrement adapté** aux périodes à hauts risques
- **Souple d'emploi** : cadence 12 jours (0,15 kg/ha) ou 14 jours (0,2 kg/ha)
- **Polyvalence** oïdium, black-rot & brenner, excoriose
- **Manipulation facile**

▣ **Un bidon = 3 ha**  
(à 0,2 kg/ha)









## FICHE D'IDENTITÉ


- **Stroby® DF** : marque déposée BASF.
  - **Autorisation de vente n°** : 9700214.
  - **Composition** : 50 % krésoxim-méthyl.
  - **Formulation** : granulés dispersables.
  - **Classement toxicologique** : N : dangereux pour l'environnement - Xn : nocif - R40 : effet cancérogène suspecté ; preuves insuffisantes - R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner à long terme des effets néfastes pour l'environnement aquatique.
  - **Usages et doses autorisés en vigne** :  
**oïdium** : 0,2 kg/ha, **Black-rot** : 0,2 kg/ha  
**rougeot parasitaire** : 0,2 kg/ha,  
**excoriose** : 0,02 kg/hl.
  - **Délai d'emploi avant récolte** : vigne : 35 jours.
  - **Délai de rentrée dans les parcelles** : 6 h (cf arrêté du 12/09/06).
  - **Distance aux points d'eau** : respecter une zone non traitée minimale de 5 m (cf arrêté du 12/09/06).
  - **Conditionnement** : bidon de 0,6 kg (groupage par 10).
  - **Limite maximale de résidus : raisin** : 1 mg/kg.
  - **Nombre de traitements autorisés** : maximum autorisé 3 par saison. Recommandation BASF : 2 non consécutifs.
  - **Conditions d'emploi** : lunettes de sécurité et masque de type P3 conseillés, port de gants et de vêtements de protection obligatoire pour les applicateurs pendant les opérations de mélange et de chargement de la bouillie. Port de gants obligatoire pour les travailleurs lors de la rentrée dans les cultures. Stroby® DF est également autorisé sur olivier.
- Dangereux - Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi.

## 10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation




### AVANT L'APPLICATION

-  **1** ▶ Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
-  **2** ▶ Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.
-  **3** ▶ Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
-  **4** ▶ Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
-  **5** ▶ Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
-  **6** ▶ Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve, ou utiliser l'incorporeur.

### PENDANT L'APPLICATION

-  **7** ▶ Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau. Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

### APRÈS L'APPLICATION

-  **8** ▶ Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
-  **9** ▶ Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
-  **10** ▶ Recycler les emballages dans le cadre des collectes ADIVALOR. Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande Osmofilm®.

® Marque déposée Site PANTEK France

## Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 <small>PRE Appel Local</small> ou <a href="http://www.agro.basf.fr">www.agro.basf.fr</a>
Une question de santé	MSA	Phyt'attitude Signalez-nous vos symptômes N° Vert 0 800 887 887
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0810 12 18 85 <small>PRE Appel Local</small> ou <a href="http://www.adivalor.fr">www.adivalor.fr</a>

# Stroby® DF

Anti-oïdium

[www.invinoveritas-basf.com](http://www.invinoveritas-basf.com)

**BASF**  
The Chemical Company

# PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI