



# 1 produit = 5 maladies

## Des points forts...

- Spécialité homologuée contre **mildiou**, **oïdium**, **black-rot**, **brenner** et **excoriose**



Mildiou



Brenner



Black-rot



Oïdium



Excoriose

- Jusqu'à **14 jours de protection**
- **Dose modulable** en fonction des maladies visées
- **Préventif sur mildiou**
- **Préventif, curatif, anti-sporulant** sur **oïdium** et **black-rot**
- **1 bidon pour 2 ha** (dose mildiou)

## Equerre®

La polyvalence pour raisonner votre programme



## ... des avantages pour vous !

**Polyvalent**  
**Pratique**  
**Performant**

- **Un seul produit** pour gérer toutes les maladies
- **Confort** de manipulation
- **Limite les erreurs** de dosage
- **Efficacité** oïdium et black-rot remarquable
- **Pratique**



**5 L = 2 ha**



## FICHE D'IDENTIT 

- **Equerre ** : marque d pos e BASF.
  - **Autorisation de vente N ** : 2030076.
  - **Composition** : 40 g/l de pyraclostrobine + 400 g/l de folpel.
  - **Formulation** : S.E (suspo- mulsion).
  - **Classement toxicologique** : Xn : Nocif. N : Dangereux pour l'environnement. R20 : Nocif par inhalation. R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau. R40 : Effet cancérog ne suspect  : preuves insuffisantes. R43 : Peut entra ner une sensibilisation par contact avec la peau. R50/53 : Tr s toxique pour les organismes aquatiques ; peut entra ner des effets n fastes   long terme pour l'environnement aquatique.
  - **Usages et doses autoris s** : **mildiou** : 2,5 l/ha, **o dium** : 1,25 l/ha, **black-rot** : 1,87 l/ha, **rougeot parasitaire** : 1,87 l/ha, **excoriose** : 0,2 l/hl.
  - **Nombre de traitements par an** : 3 autoris s (homologation) ; recommandation BASF : 1 mildiou, 2 o dium.
  - **D lai d'emploi avant r colte** : 35 jours (raisin de cuve) ; 70 jours (raisin de table).
  - **D lai de rentr e dans les parcelles** : 48 heures. Port de gants recommand  pendant 5 jours pour les travailleurs entrant dans la culture apr s traitement.
  - **Zone non trait e** : 20 m tres.
  - **Conditionnement** : bidon de 5 litres pour 2 ha.
  - **Import tol rance** : exportation possible vers USA et Canada.
  - **Limite maximale de r sids** : **Pyraclostrobine** : raisin de table : 1 p.p.m., raisin de cuve : 2 p.p.m. ; **Folpel** : raisin de table : 0,02 p.p.m., raisin de cuve 5 p.p.m.
  - **Pr cautions d'emploi lors de la pr paration de la bouillie** : port de gants obligatoire (gants en nitrile ou n opr ne EN 374), lunettes de s curit  et masque de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, v tements de travail de niveau de protection 4.
- Dangereux - Avant toute utilisation, lire attentivement l' tiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et pr cautions d'emploi.

### 10 gestes responsables et professionnels de la pulv risation

#### AVANT L'APPLICATION

- 1 ► Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et ferm    cl .
- 2 ► Bien lire l' tiquette et les pr cautions d'emploi avant utilisation.
- 3 ► Se prot ger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
- 4 ► V rifier r guli rement et maintenir le bon  tat et le r glage du mat riel d'application.
- 5 ► Surveiller le remplissage de la cuve du pulv risateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
- 6 ► Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rin age dans la cuve, ou utiliser l'incorporateur.

#### PENDANT L'APPLICATION

- 7 ► Ne pas traiter les cours d'eau et foss s en eau. Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour  viter toute d rive de pulv risation vers les foss s, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou b timents.

#### APR S L'APPLICATION

- 8 ► Appliquer apr s dilution les fonds de cuve et les eaux de rin age sur la parcelle.
- 9 ► Nettoyer les  quipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
- 10 ► Recycler les emballages dans le cadre des collectes **ADIVALOR **. Pr venir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande Osmofilm .

  Marque d pos e S  PANTEK France

### Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	N�Azur 0 810 02 30 33 <small>PRE Appel Local</small> ou <a href="http://www.agro.basf.fr">www.agro.basf.fr</a>
Une question de sant�	MSA	Phytattitude Signalez-nous vos sympt�mes N� Vert 0 800 887 887
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service S�curit� 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N�Azur 0810 12 18 85 <small>PRE Appel Local</small> ou <a href="http://www.adivalor.fr">www.adivalor.fr</a>



Anti-mildiou

[www.invinoveritas-basf.com](http://www.invinoveritas-basf.com)

**BASF**  
The Chemical Company

# PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI