


Osiris® Win

Pour bien commencer la protection des céréales

BASF
The Chemical Company

LA PROTECTION FONGICIDE DOIT EN PRIORITÉ SE RAISONNER AVANT L'APPARITION DES SYMPTÔMES.




La septoriose contamine les feuilles supérieures de la céréale par effet «splashing» des gouttes de pluie à partir des feuilles du bas.

■ Il est important d'éviter la mise en place d'un « pied de cuve » sur les feuilles basses.


La F2 contribue à 85% du rendement avec la F1 et l'épi.

Contribution au rendement



■ Il convient donc de protéger la F2 des maladies comme la septoriose et la rouille brune.

Dès le stade 2 nœuds de la céréale, la F2 est présente. Il s'agit alors de la dernière feuille sortie.



■ Il est nécessaire de construire la protection fongicide avant le stade 2 nœuds.

[Recommandations]


Cette année l'inoculum de septoriose est très élevé en Midi-Pyrénées. La septoriose est déjà présente sur les feuilles basses.

Compte tenu du stade actuel des céréales, **dès début avril**, il convient d'intervenir* stade 1-2 nœuds avec :

Osiris® Win à 1,5 L/ha

Ceci vous permettra de préserver l'état sanitaire de la céréale contre la septoriose et la rouille brune. Une protection à partir de dernière feuille étalée devra s'envisager selon l'évolution de la maladie*.

*se référer au BSV



Osiris® Win: marque déposée BASF. Autorisation de vente : n° 2090092. Composition : 37,5 g/L d'époxiconazole + 27,5 g/L de metconazole. Formulation : Concorré émulsionnable (EC). Usages et doses autorisés : BLÉS : septoriose, rouille brune et jaune, fusarioses des épis, helminthosporiose : 3L/ha. ORGES : rhynchosporiose, helminthosporiose, rouille naine : 2L/ha. TRITICALE : septoriose, rouille brune et jaune, fusarioses des épis : 3L/ha. SEIGLES : rhynchosporiose, rouille brune : 2L/ha. AVOINES : rouille couronnée : 3L/ha.

Classement :

Attention. H317 : peut provoquer une allergie cutanée. H351 : susceptible de provoquer le cancer. H361Df : susceptible de nuire à la fertilité susceptible de nuire au fœtus. H400 : très toxique pour les organismes aquatiques. H411 : toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Distance aux points d'eau : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. Distance aux aires non cultivées adjacentes : Pour protéger les arthropodes et les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres en bordure d'une aire non cultivée adjacente. Nombre maximum d'applications : 2/an. Délai avant récolte : 35 jours. Délai de rentrée dans la parcelle : 48 heures après traitement.

Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Lors de la manipulation des produits, gants en nitrile ou néoprène (EN 374), lunettes de sécurité, masque ou de mi-masque avec cartouche filtrante A2 P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtements de travail de niveau de protection 4. Avril 2013. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer avant toute application, auprès du N° Azur BASF AGRO 0810 023 033 qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. 837CFE0413SUD.

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION		PENDANT L'APPLICATION	
1	Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.	7	Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les forêts, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.
2	Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi.	8	Appliquer après dilution les fonds de creux et les eaux de rinçage sur la parcelle.
3	Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).	9	Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
4	Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage de matériel d'application.	10	Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande le procédé Osimul®.
5	Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).		
6	Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recueillir dans le cadre des collectes Adivalor.		

Contacts utiles

Informations techniques Étiquettes et FDS	BASF Agro	08 00 00 00 00 ou www.basf-agro.fr
Une question de santé	MSA	Phytosécurité 0 800 887 887 (du lundi au vendredi, de 8h à 18h)
En cas d'urgence (incendie ou accident)	BASF Agro	Service Secours clients 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	08 00 00 00 00 ou www.adivalor.fr

Retrouvez plus d'informations sur le site :
www.agro.basf.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.