


Osiris® Win

La polyvalence à tous les stades

BASF
The Chemical Company


Quel fongicide céréales permet de répondre à votre contexte maladie du T1 au T3 ?



Maladies ciblées



Votre solution



Septoriose



Osiris® Win 1 à 1,5 l/ha

Rouille jaune



Osiris® Win 1 à 1,5 l/ha

Rouille brune



Osiris® Win 1 à 1,5 l/ha



Septoriose



Osiris® Win 1,5* à 2 l/ha

Rouille brune



Osiris® Win 1,5* à 2 l/ha

*si T1 ou pression tardive.



Fusariose



Osiris® Win 1,5 à 2,4 l/ha

Septoriose



Osiris® Win 1,8 à 2 l/ha

Rouille brune



Osiris® Win 1,8 à 2 l/ha

Osiris® Win
dès 1-2 nœuds à floraison

**pour une pleine efficacité des fongicides, il est recommandé de traiter en préventif.

Osiris Win® : marque déposée BASF. Autorisation de vente : n° 2090092. Composition : 37,5 g/L d'époxiconazole + 27,5 g/L de metconazole. Formulation : Concentré émulsionnable (EC). Usages et doses autorisés : BLÉS : septorioses, rouilles brune et jaune, fusarioses des épis, helminthosporiose : 3L/ha. ORGES : rhynchosporiose, helminthosporiose, rouille naine : 2L/ha. TRITICALES : septorioses, rouilles brune et jaune, fusarioses des épis : 3L/ha. SEIGLES : rhynchosporiose, rouille brune : 2L/ha. AVOINES : rouille couronnée : 3L/ha.

Classement :

Attention. H317 : peut provoquer une allergie cutanée. H351 : susceptible de provoquer le cancer. H361D : susceptible de nuire à la fertilité susceptible de nuire au fœtus. H400 : très toxique pour les organismes aquatiques. H410 : très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Distance aux points d'eau : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. Distance aux aires non cultivées adjacentes : Pour protéger les arthropodes et les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres en bordure d'une aire non cultivée adjacente. Nombre maximum d'applications : 2/an. Délai avant récolte : 35 jours. Délai de rentrée dans la parcelle : 48 heures après traitement.


Usages, doses, conditions et restrictions d'emploi : consulter www.agro.basf.fr.

Protection utilisateur lors préparation bouillie : gants en nitrile EN374, bottes, combinaison de travail polyester/coton (65%/35%) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

Février 2014. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer avant toute application, auprès du N° Azur BASF AGRO 0810 023 033 qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. 173CFE0214SUD

BASF Agro SAS - 21 chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex - Tél. 04 72 32 45 45

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation



PENDANT L'APPLICATION



Contacts utiles

Informations techniques Étiquettes et FDS	BASF Agro	04 72 32 45 45 ou www.basf-agro.fr
Une question de santé	SMA	01 49 64 57 33 ou service.client@basf.fr
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Secours BASF 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	04 72 32 45 45 ou www.adivalor.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.