

Les chiffres Repères 2014 □ Tournesol

Nuisibilité maladies phomopsis et/ou phoma



Protection fongicide

Tournesol oléique



1 € investi* rapporte

3 €

Tournesol classique



1 € investi* rapporte

2 €

* Jetset® 0,4 l/ha résultat moyen obtenu en essais de 2010 à 2014

JETSET® : COMMENT S'UTILISE LE PRODUIT ?

COMMENT L'UTILISER ?

Jetset® s'utilise à 0,4 l/ha.

Il est utilisable en mélange avec bore* pour un haut niveau de rendement (*sous réserve de compatibilité, consultez votre fabricant)

Traiter selon le niveau de risque estimé dans le BSV et en fonction de la tolérance variétale



Recommandation BASF : Limite Passage Tracteur (LPT)

Plage d'application : BBCH 20 (10 feuilles) jusqu'à BBCH 65 (pleine floraison)

Jetset® Carte d'identité

AMM : N° 2100037

Composition : 200 g/l de bosalid + 200 g/l de dimoxystrobine

Formulation : suspension concentrée (SC)

Conditionnement : bidon EcoPack de 5 litres

Usages autorisés :

Tournesol : phoma et phomopsis à 0,4 l/ha

Colza : sclerotinia et alternaria à 0,5 l/ha

Classement :



Attention

H302 : nocif en cas d'ingestion.

H332 : nocif par inhalation

H317 : peut provoquer une allergie cutanée

H351 : susceptible de provoquer le cancer.

H361d : susceptible de nuire au fœtus

H400 : très toxique pour les organismes aquatiques

H410 : très toxique pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets néfastes à long terme.

ZNT : 5 m

Nombre max d'applications : Au maximum une application tous les 3 ans sur tournesol.

Délai avant récolte : 30 jours sur tournesol

Délai de rentrée dans la parcelle : 48h

Précaution d'emploi :

- Il est recommandé de ne pas planter de choux-raves, d'endives, de cresson d'eau, de chicorées, d'épices, de plantes pour infusion destinée à l'alimentation humaine l'année suivante sur une parcelle précédemment traitée avec une préparation contenant du bosalid.

Protection utilisateur lors de la manipulation du produit : Porter des gants en nitrile EN 374, des bottes, une combinaison de travail polyester/coton (65%/35%) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial et un masque de type A2P3

STADES D'APPLICATION

Phomopsis
Phoma
Jetset®
0,4 l/ha



AVANT L'APPLICATION



- 1 ► Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
- 2 ► Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi.
- 3 ► Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
- 4 ► Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
- 5 ► Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
- 6 ► Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor.



PENDANT L'APPLICATION



- 7 ► Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.



APRÈS L'APPLICATION



- 8 ► Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
- 9 ► Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
- 10 ► Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande le procédé Osmofilm.
* Marque déposée Sté PANTEK (France)



Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 ou www.agro.bASF.fr
Une question de santé	MSA	Phyt'attitude N° Vert 0 800 887 887 APPEL GRATUIT DEPUIS UN PÔTÉFÉ
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0 810 12 18 85 ou www.adivalor.fr