

# Les chiffres Repères Tournesol 2017

Nuisibilité  
maladies  
phomopsis  
et/ou phoma



Protection  
fongicide



\* Livraison silo

\*\* Jetset® 0,4 l/ha résultat moyen  
obtenu en essais de 2010 à 2014

# Jetset® : comment l'utiliser ?


## Jetset® s'utilise à 0,4 L/Ha

Il est utilisable en mélange avec bore\* pour un haut niveau de rendement.

(\*sous réserve de compatibilité, consultez votre fabricant)

Phomopsis

Phoma



Recommandation BASF : Limite Passage Traiteur (LPT)

Plage d'application : BBCH 20 (10 feuilles) jusqu'à BBCH 65 (pleine floraison)

Traiter selon le niveau de risque estimé dans le BSV et en fonction de la tolérance variétale.

## Jetset® : Carte d'identité

AMM : N° 2100037

Composition : 200 g/l de boscalid + 200 g/l de dimoxystrobine

Formulation : suspension concentrée (SC)

Conditionnement : bidon EcoPack de 5 litres

### Usages autorisés :

Tournesol : phoma et phomopsis à 0,4 l/ha

Colza : sclérotinia et alternaria à 0,5 l/ha

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou [www.agro.basf.fr](http://www.agro.basf.fr) et/ou [www.phytodata.fr](http://www.phytodata.fr).

BASF France Division Agro, 21 chemin de la Sauvegarde, 69130 Ecully - Tél. 04 72 32 45

### Classement :



Attention

H302 : nocif en cas d'ingestion.

H332 : nocif par inhalation

H317 : peut provoquer une allergie cutanée

H351 : susceptible de provoquer le cancer.

H361d : susceptible de nuire au fœtus

H400 : très toxique pour les organismes aquatiques

H410 : très toxique pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets néfastes à long terme.

SGH07 - SGH08 - SGH09

ZNT : 5 m

Nombre max d'applications : 1 application / an

Délai avant récolte : 30 jours sur tournesol

Délai de rentrée dans la parcelle : 48h

Précaution d'emploi : Il est recommandé de ne pas planter de choux-raves, d'endives, de cresson d'eau, de chicorées, d'épices, de plantes pour infusion destinée à l'alimentation humaine l'année suivante sur une parcelle précédemment traitée avec une préparation contenant du boscalid.

Protection utilisateur lors de la manipulation du produit : Porter des gants en nitrile EN 374, des bottes, une combinaison de travail ou un ensemble veste-pantalons, dédié à la manipulation des produits phytopharmaceutiques, certifié norme ISO 27065 - niveau 1.

Juin 2018. Annule et remplace toutes les versions précédentes. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer avant toute application, auprès du N° Vert de BASF qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. 381TOFE0618SUD.

Pour toute information technique,  
nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299

Service & appel  
gratuits

### LES BONS GESTES POUR TRAITER EN TOUTE SÉCURITÉ



► N'utilisez les produits phytopharmaceutiques que si nécessaire.



► Protégez votre santé et celle de votre entourage.



► Surveillez les conditions météorologiques.



► Protégez les points d'eau.



► Protégez les pollinisateurs.



► Préservez la faune sauvage.



D'INFOS SUR [WWW.MON-PHYTO-PRACTIQUE.FR](http://WWW.MON-PHYTO-PRACTIQUE.FR)

FLASHEZ-MOI