


Herbicides céréales

Celtic®

La complémentarité de la pendiméthaline et du picolinafène, pour limiter les risques d'apparition des résistances sur graminées et dicots.



Efficacité et régularité renforcées sur vulpin :



65 essais BASF - AG (X) : anti-graminée efficace sur vulpin.



Large spectre anti-dicots :

	Celtic® (2,5 L/ha) Pré-levée	Celtic® (2,5 L/ha) Post-levée
Alchémille	■	■
Capselle BP	■	■
Coquelicot	■	■
Colza rep.	■	■
Gaillet	■	■
Géranium sp	■	■
Fumeterre	■	■
Lamier pourpre	■	■
Matricaire	■	■
Pensée	■	■
Sanve	■	■
Séneçon	■	■
Stellaire	■	■
Véroniques	■	■

Efficacité en % ■ 95-100 ■ 85-94 ■ 70-84 ■ 50-69

2 substances actives complémentaires pour limiter les risques d'apparition des résistances sur graminées et dicots :

Picolinafène
Aryloxicopolinamides

F1

Pendiméthaline
Dinitroanilines

K1

Celtic® : une solution souple d'emploi



Blé tendre d'hiver, Blé dur d'hiver

Orge d'hiver, Triticale



ou



Optimisation du désherbage avec Celtic®

- Traiter sur un sol soigneusement préparé, un semis régulier et bien recouvert (2-3cm).
- Traiter sur un sol humide.
- Décaler l'application si de fortes pluies sont à craindre.
- Eviter les applications sur sols sableux, hydromorphes ou sur des sols contenant plus de 6% de matière organique.

Qu'est-ce que Celtic® ?

AMM	N° 9900340
Formulation	Suspension concentrée (SC)
Composition	16 g/L de picolinafène et 320 g/L de pendiméthaline
Usages et doses autorisés	Blé tendre d'hiver, blé dur d'hiver, triticale, épeautre, orge d'hiver et seigle d'hiver, dose : 2,5 L/ha Orge de printemps : 2 L/ha
Nombre maximum d'applications	1 par an, ne pas fractionner
ZNT aquatique	20 mètres
DRE	6 heures
DAR	90 jours
Autres données réglementaires	Délai entre une application de pendiméthaline et le semis ou la plantation de cultures sur lesquelles la pendiméthaline n'est pas autorisée : – légumes racines et tubercules : 190 jours ; betterave à sucre : 300 jours ; légumes bulbes, légumes feuilles, avoine : 200 jours ; cultures de crucifères : 250 jours - autres cultures : 200 jours. Stocker le produit à une température inférieure à 30°C.



Pour toutes informations techniques,
nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299 Service & appel gratuits

Protection utilisateur lors de la manipulation : gants en nitrile EN374, EPI vestimentaire (combinaison) certifié selon norme NF EN ISO 27065, tablier Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. N° agrément : IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou consulter www.agro.bASF.fr et/ou www.phytodata.com. Octobre 2019. 600CEHE1019SUD. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application auprès du N° Vert, qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

®Marque déposée BASF : Celtic® : SGH09. Attention. H400 : très toxique pour les organismes aquatiques. H410 : très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 : peut produire une réaction allergique. Contient de la pendiméthaline, 1-2 Benzisothiazole-3(2H)-one EUH401 : respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

SGH09



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**