



We create chemistry

Anti-oïdium vigne

## Ancolie®

Faites le choix de la facilité




- **FACILE** à positionner dans un programme
- **FACILE** à intégrer dans les chantiers de traitement

### FACILE À POSITIONNER DANS UN PROGRAMME ANTI-OÏDIUM

#### ■ MODE D'ACTION COMPLET

Ancolie® provoque la rupture des filaments de mycélium : **pour une action complète même après contamination.**



Croissance mycélienne

Ancolie® peut contrôler l'oïdium même sur épidémie initiée (sur des symptômes non encore visibles). Il contribue à limiter les dégâts.

#### ■ EFFICACITÉ PREVENTIVE

Une protection efficace et régulière des feuilles et des grappes **pendant 14 jours**.



Synthèse de 34 essais BASF

**97,5%**  
d'efficacité,  
avant  
contamination.

#### ■ EFFICACITÉ CURATIVE



Vinipole Sud Bourgogne, organisme BPE

Encore  
**87%**  
d'efficacité,  
même **3 jours**  
après  
contamination.

**POUR OPTIMISER VOTRE PROGRAMME,  
PRÉFÉRER UN POSITIONNEMENT PRÉVENTIF.**

## FACILE À INTÉGRER DANS LES CHANTIERS DE TRAITEMENT



- Compatible avec les spécialités du marché notamment les anti-mildiou\*
- **Pionnier de la famille des benzophenones, constitue un outil d'alternance** reconnu dans les programmes anti-oïdium et anti-black-rot grâce à sa souplesse de positionnement
- **Nombreuses tolérances d'importation** pour les principales destinations d'export des vins et alcools français

\*Se reporter à la réglementation mélange en vigueur et demander conseil à votre conseiller.

## PRÉCONISATIONS D'EMPLOI

### ANCOLIE® S'UTILISE DURANT TOUTE LA PÉRIODE DE SENSIBILITÉ À L'OÏDIUM



#### Ancolie® est un anti-oïdium performant.

- Homologué à la dose de 0,2 l/ha
- Utilisable pendant toute la période de sensibilité à l'oïdium
- A utiliser en préventif, à la cadence de 14 jours
- 2 applications maximum par saison (en incluant les autres produits à mode d'action similaire (aryle phényle cétones))
- Ne pas utiliser en dernier traitement

## FICHE D'IDENTITÉ

Marque déposée BASF	Ancolie®
AMM	N° 2060050
Composition	500 g/l de métraphénone
Formulation	SC
Usage et dose autorisés en vigne	Oïdium de la vigne à 0,2 l/ha
Nombre d'applications	2 maximum par an en incluant tous les Aryle phényle cétones
Délai d'emploi avant récolte	28 jours
Distance aux points d'eau	5 m
ZNT riverains	10 m
Délai de rentrée	6 h

Pour toutes informations techniques,  
nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299 Service & appel  
gratuits

Protection utilisateur lors de la préparation de la bouillie: gants en nitrile EN374, EPI vestimentaire certifié selon norme NF EN ISO 27065 (niveau C1), tablier Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial. Porter des gants et un vêtement de protection approprié pendant les phases de mélange/chargement et d'application.

BASF France SAS – Division Agro – 21 chemin de la Sauvegarde – 69134 Ecully Cedex - N° agrément : IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.692VIFE0120SUD - janvier 2020. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, [.basf.fr](http://.basf.fr) et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com). Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application auprès du N° Vert, qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

Ancolie® : SGH09. H 411 : toxique pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 : respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. EUH208 : contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**