


Herbicides maïs

Conquéran[®]

**Votre partenaire de désherbage maïs pour
lutter contre les dicots annuelles
et les vivaces**

Préconisations d'emploi du Conquéran[®]

Les **meilleures efficacités** sont obtenues sur de **jeunes dicotylédones, du stade 2 cotylédons jusqu'à 6 feuilles**, lorsque les **conditions météorologiques sont favorables** à une pousse active de la végétation. Les conditions chaudes et humides améliorent la rapidité d'action de Conquéran. L'efficacité de Conquéran est optimale dans les 2 à 4 semaines suivantes.



* en application unique ou en fractionnement, ne pas dépasser une dose totale de 0,4 kg/ha par emblavement

Sur Flore Mixte

**Programme
pré-levée puis
post-levée**

Une solution
racinaire AG
ou à SL **

Tricétone
0,75 + 0,5 l/ha
+ Conquéran
0,2 - 0,3 kg/ha

** une solution racinaire
anti-graminées (AG) ou à
spectre large (SL).

**Programme tout
en post-levée
1 passage**

Tricétone 0,5 l/ha
+ SU AG 0,5 l/ha
+ Conquéran
0,2 kg/ha

**Programme tout
en post-levée
2 passages**

Tricétone 0,5 l/ha
+ SU AG 0,5 l/ha
+ Conquéran
0,2 kg/ha

Tricétone 0,5 l/ha
+ SU AG 0,5 l/ha
+ Conquéran
0,2 kg/ha

Sur Flore Vivace

Pression moyenne

Conquéran
0,4 kg/ha

**Pression forte
ou levées
échelonnées**

Conquéran
0,2 kg/ha

Conquéran
0,2 kg/ha

Conquérant sur flore vivace

Adventices	Dose de Conquérant	Stades de l'adventice
Liseron des champs	0,4 kg/ha	20 à 30 cm
Liseron des haies	0,4 kg/ha	20 à 30 cm
Rumex de semis et de souches	0,4 kg/ha	Du stade rosette à l'élongation de la hampe florale
Chardon	0,4 kg/ha	20 à 30 cm

Conquérant : un très large spectre d'efficacité

Conquérant (0,4 kg/ha)	Conquérant (0,4 kg/ha)
DICOTYLEDONES CLASSIQUES	DICOTYLEDONES DIVERSES
Amarante réfléchie	Capselle
Chénopodes sp.	Colza [repousses]
Morelle	Lamier pourpre
Renouée persicaire [et à f. de P.]	Matricaire camomille
DICOTYLEDONES DIFFICILES	Mouron des champs
Ambroisie	Pourpier potager
Arroches sp.	Ravenelle
Datura	Sanve
Fumeterre officinal	Séneçon
Gaillet gratteron	Spergule des champs
Laiterons sp.	Stellaire
Linaires sp.	DICOTYLEDONES VIVACES
Mercuriale annuelle	Chardon des champs
Pensée des champs	Liseron des champs
Renouée des oiseaux	Liseron des haies
Renouée liseron	Renouée amphibie
Véronique de Perse	Rumex sp.

Conquérant présente un très large spectre d'activité sur **dicotylédones annuelles difficiles** et sur **dicotylédones vivaces** : le tritosulfuron et le dicamba font preuve d'une très bonne **complémentarité**.

Légende

Très sensible (TS)

> 95%

Sensible (S)

85-95%

Moyennement sensible (MS)

70-85%

Peu sensible (PS)

50-70%

Très peu sensible (TPS)

< 50%

Niveaux d'efficacité attendus lorsque les conditions de mise en œuvre sont respectées (temps poussant, hygrométrie > 70 %, adventices jeunes, etc).

Fiche d'identité de Conquérant®

AMM n°	2090153
Formulation	WG (granulés à disperser dans l'eau)
Composition	600 g/kg dicamba + 125 g/kg tritosulfuron
Usages et doses autorisés	Maïs ensilage, Maïs grain : 0.4 kg/ha, à partir de BBCH 13 - Sorgho fourrage, Sorgho grain : 0.3 kg/ha, stade d'application : 4 à 6 feuilles.
Nombre maximum d'applications	Maïs ensilage, Maïs grain, Sorgho fourrage, Sorgho grain : 1 application/an, fractionnement possible en 2 applications.
ZNT (distance aux points d'eau)	5 mètres
DRE	24 heures
DAR	Maïs ensilage : 60 jours ; Maïs grain : 90 jours ; Sorgho fourrage : 60 jours ; Sorgho grain : 90 jours
Conditions d'emploi	Ne pas implanter de culture type « légume fruit » sur une parcelle préalablement traitée avec cette préparation ou toute autre préparation contenant du tritosulfuron.

BASF France SAS - Division Agro – 21, chemin de la Sauvegarde – 69134 Ecully Cedex. Agrément : N° IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Détenteur d'homologation : BASF. ® Marque déposée BASF. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ ou www.agro.basf.fr et/ou www.phytodata.com. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Vert qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. REF746MAHE0420QUEST

Protection utilisateur lors de la manipulation : Gants en nitrile EN374, EPI vestimentaire (combinaison) certifié selon norme NF EN ISO 27065, tablier Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

Pour toutes informations techniques,
nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299

Service & appel
gratuits

Conquérant® : SGH07, SGH09 - Attention - EUH208 : Peut déclencher une réaction allergique. Contient : Tritosulfuron - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. - H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques. - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.