



We create chemistry

Anti-oïdium vigne

Vivando®

Faites le choix de la facilité




- **FACILE à positionner** dans un programme
- **FACILE à intégrer** dans les chantiers de traitement

FACILE À POSITIONNER DANS UN PROGRAMME ANTI-OÏDIUM

■ MODE D'ACTION COMPLET

Vivando® provoque la rupture des filaments de mycélium : **pour une action complète même après contamination.**



Croissance mycélienne

Vivando® peut contrôler l'oïdium même sur épidémie initiée (sur des symptômes non encore visibles). Il contribue à limiter les dégâts.

■ EFFICACITÉ PREVENTIVE

Une protection efficace et régulière des feuilles et des grappes **pendant 14 jours**.



Synthèse de 34 essais BASF

97,5%
d'efficacité,
avant
contamination.

■ EFFICACITÉ CURATIVE



Vinipole Sud Bourgogne, organisme BPE

Encore
87%
d'efficacité,
même **3 jours**
après
contamination.

**POUR OPTIMISER VOTRE PROGRAMME,
PRÉFÉRER UN POSITIONNEMENT PRÉVENTIF.**

FACILE À INTÉGRER DANS LES CHANTIERS DE TRAITEMENT



- Compatible avec les spécialités du marché notamment les anti-mildiou*
- Pionnier de la famille des benzophénones, constitue un outil d'alternance reconnu dans les programmes anti-oïdium et anti-black-rot grâce à sa souplesse de positionnement
- Nombreuses tolérances d'importation pour les principales destinations d'export des vins et alcools français

*Se reporter à la réglementation mélange en vigueur et demander conseil à votre conseiller.

PRÉCONISATIONS D'EMPLOI

VIVANDO® S'UTILISE DURANT TOUTE LA PÉRIODE DE SENSIBILITÉ À L'OÏDIUM



Vivando® est un anti-oïdium performant.

- Homologué à la dose de 0,2 l/ha
- Utilisable pendant toute la période de sensibilité à l'oïdium
- A utiliser en préventif, à la cadence de 14 jours
- 2 applications maximum par saison (en incluant les autres produits à mode d'action similaire (aryle phényle cétones))
- Ne pas utiliser en dernier traitement

FICHE D'IDENTITÉ

Marque déposée BASF	Vivando®
AMM	N° 2060050
Composition	500 g/l de métraphénone
Formulation	SC
Usage et dose autorisés en vigne	Oïdium de la vigne à 0,2 l/ha
Nombre d'applications	2 maximum par an en incluant tous les Aryle phényle cétones
Délai d'emploi avant récolte	28 jours
Distance aux points d'eau	5 m
ZNT riverains	10 m
Délai de rentrée	6 h

Pour toutes informations techniques,
nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299 Service & appel gratuits

Protection utilisateur lors de la préparation de la bouillie: gants en nitrile EN374, EPI vestimentaire certifié selon norme NF EN ISO 27065 (niveau C1), tablier Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial. Porter des gants et un vêtement de protection approprié pendant les phases de mélange/chargement et d'application.

BASF France SAS – Division Agro – 21 chemin de la Sauvegarde – 69134 Ecully Cedex - N° agrément : IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.711VIFE0220SUD - février 2020. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, .baf.fr et/ou www.phytodata.com. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application auprès du N° Vert, qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

Vivando® : SGH09. H 411 : toxique pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 : respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. EUH208 : contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**