

Fongicide Vigne

Hexagon®

L'association gagnante contre l'oïdium



Hexagon® : puissant par la complémentarité des substances actives

- Hexagon® associe 2 matières substances puissantes et complémentaires :

- Le krésoxim-méthyl, dont les propriétés préventives et curatives sont largement reconnues, et le boscalid **homologués sur oïdium et black-rot**,
- Son mode d'action différent, efficace sur une large partie du cycle de l'oïdium, en fait un partenaire de haut niveau et participe à la régularité de la performance du Hexagon®,

- Hexagon® dispose d'une bonne résistance au lessivage,
- Hexagon® n'a pas d'incidence sur les fermentations et sur les qualités organoleptiques des vins et des eaux de vie.

| | Krésoxim-méthyl | Boscalid |
|-------------------------------------|-----------------|----------|
| Germination | ● | ● |
| Développement des tubes germinatifs | | ● |
| Formation des appressoria | | ● |
| Croissance mycélienne | ● | ● |
| Sporulation | ● | |


Hexagon® : une efficacité préventive de haut niveau

Très efficace à différentes étapes du cycle du développement de l'oïdium, Hexagon® empêche la maladie de s'installer.

Dans le cadre des bonnes pratiques, on préférera l'utilisation de Hexagon® en préventif.

Hexagon® présente également une bonne curativité lorsque le traitement est réalisé en début d'attaque d'oïdium avant l'extériorisation des symptômes :

- Sécurise l'efficacité de votre programme,
- Jusqu'à 14 jours de protection,
- A fait ses preuves en conditions de forte pression.



Hexagon® : le partenaire de choix pour construire vos programmes

Hexagon® est utilisable durant toute la période de sensibilité de la vigne à l'oïdium et sur l'ensemble des cépages.

Viser les périodes où le risque est le plus important, c'est-à-dire :

- Entre boutons floraux séparés et fermeture de la grappe, en encadrement de floraison,
- Dans le cadre du positionnement « Tôt et fort » : en début de protection oïdium.



- Réaliser un maximum de 2 applications de Hexagon® par saison, en alternance avec des anti-oïdium à mode d'action différent.
- Comme pour toute application, veiller à la bonne qualité de pulvérisation de la bouillie.
- En cas de pression exceptionnelle de la maladie, la cadence sera resserrée.
- Pour la bonne gestion des familles chimiques, veiller à ne pas appliquer plus de 2 SDHI par saison, en prenant en compte tous les produits du programme.

Fiche d'identité produit

Hexagon® : marque déposée BASF

AMM : N° 2060085.

Composition : 200 g/L de boscalid + 100 g/L de krésoxim-méthyl

Formulation : suspension concentrée SC

Conditionnement : bidon de 1 litre et 10 litres.

Usages et doses autorisés : Vigne : oïdium, black-rot à 0.4 L/ha. Pour les autres cultures, se référer à l'étiquette

Distance aux points d'eau : respecter une zone non traitée de 5 m par rapport aux points d'eau.

Nombre max d'applications par an : 2 entre les stades BBCH 11 & 83 pour contrôler l'ensemble des maladies. Intervalle minimum entre les applications : 10 jours

Délai avant récolte vigne : 28 jours

Délai de rentrée dans la parcelle : 48 heures

Protection des personnes présentes et des résidents :

Respecter une distance d'au moins 10 m entre le dernier rang traité et l'espace susceptible d'être fréquenté par des personnes présentes ou des résidents pour les usages sur « vigne ».

Spe8 : Pour protéger les abeilles et autres insectes polliniseurs, ne pas utiliser en présence d'abeilles et autres polliniseurs, ne pas appliquer durant la période de floraison, ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.

BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. N° agrément : IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, basf.fr et/ou www.phytodata.com. Octobre 2020. 870VIFE1020SUD. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application auprès du N° Vert, qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

Pour toutes informations techniques,
nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299 Service & appel gratuits

Protection utilisateur lors de la manipulation : gants en nitrile EN374, EPI vestimentaire conforme à la norme ISO 27065, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial. Porter des gants et un vêtement de protection approprié pendant les phases de mélange/chargement et d'application. Se reporter à l'étiquette du produit.

Hexagon® : SGH08, SGH09. Attention. H351 : susceptible de provoquer le cancer. H410 très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 : contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et de la 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

SGH08



SGH09

