

Désherbage des céréales

Pico®solo

Le renfort anti-dicots qui fait la différence

Bénéfices :

- Référence sur pensées et véroniques
- Partenaire de vos anti-graminées
- Atout pour limiter le risque de développement des résistances

Le partenaire indispensable sur pensée, véroniques, gaillet, séneçon, stellaire...

Picosolo (133 g/ha)

Automne	
Capselle	Lamier
Myosotis	Gaillet
Pensées	Stellaire
Ravenelle	Séneçon
Sanve	Alchémille
Stellaire	Matricaire
Véroniques	Coquelicot

Sortie d'hiver	
Véroniques perse	
Pensée	
Véroniques FL	
Véroniques des champs	
Gaillet	

Efficacité


95-100 %

85-94 %

70-84 %

REF AG1 (0,9 L/ha) + Huile (1 L/ha)

PICOSOLO (70 g/ha) + REF AG1 (0,9 L/ha) + Huile (1 L/ha)



Un mode d'action différent de celui des inhibiteurs de l'ALS,
précieux pour la prévention des résistances


Picolinafène
Aryloxicipolinamides
Groupe HRAC

F1

Inhibition de la synthèse
des caroténoïdes,
pigments protecteurs de la
photosynthèse

Recommandations

Picosolo est efficace sur adventices jeunes (levée à 6 feuilles) avant le repos végétatif ou après la reprise de végétation de la culture.



*Si les adventices sont développées, privilégier une dose plus élevée de Picosolo.

Conditions d'utilisation

- ✓ Dès 5°C
- ✓ Eviter les conditions stressantes pour la culture, les périodes de fortes gelées ou d'amplitudes thermiques importantes

Des blanchiments localisés et passagers peuvent apparaître sur la culture, ils sont sans conséquence sur le rendement.

Carte d'identité

- **PICO[®]SOLO** : marque déposée BASF
- **AMM** : n° 2060063
- **Composition** : 75% de Picolinafène
- **Formulation** : WG
- **Usages autorisés** : blé tendre d'hiver, orge d'hiver : 133 g/ha - blé dur d'hiver, triticale : 100 g/ha.
1 application par culture et par parcelle entre BBCH 00 et BBCH30.
ZNT aquatique :
 - Application avant le repos végétatif (automne) : 50 m avec DVP de 5 m.
 - Application après la reprise de végétation (printemps) : 50 m
- **Délai avant récolte** : F (BBCH 30)
- **Délai de rentrée dans la parcelle** : 6 h après le traitement

Pour toutes informations techniques,
nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299 Service & appel gratuits

Protection utilisateur lors de la préparation de la bouillie : gants en nitrile NF EN ISO 374-1/A1 réutilisables NF EN 16523-1+A1, EPI vestimentaire certifié EN ISO 27065/A1, blouse Cat. III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial

BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. N° agrément : IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. [®]Marque déposée BASF. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, .basf.fr et/ou www.phytodata.com. Mai 2021 – REF 929CEHE0521R. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application auprès du N° Vert, qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

Pico[®]solo : SGH08, SGH09. Attention. H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques. H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

SGH08



SGH09

