


Atout n° 5 Spectrum®, 1^{er} au bilan technico-économique

Spectrum® convient à toutes les stratégies de désherbage intégrant une solution racinaire. En fin de campagne, les données issues des panels montrent qu'il s'adapte efficacement à de très nombreuses situations. Qu'il soit intégré dans une solution en 1 passage de pré-levée ou dans un programme incluant 1 pré-levée et 1 post-levée, Spectrum® est au rendez-vous par rapport au critère du coût du désherbage !




Analyse technico-économique de Spectrum® sur 3 campagnes en France

Bilan panel : coûts du désherbage en 1 passage en pré-levée (A.G* +/- partenaire)



Bilan panel : coûts du désherbage en 2 passages : pré et post-levée



Dans une stratégie d'un passage de pré ou dans une stratégie « pré puis post », Spectrum® permet de désherber à un moindre coût par rapport aux solutions alternatives disponibles pour les prochaines campagnes.

Sources : déclaration des agriculteurs utilisateurs de solutions de pré-levée - passage de pré-levée : produit appliqué seul ou avec un partenaire - passage de post-levée : toutes les solutions répertoriées sont intégrées - *A.G = anti-graminées

Solutions racinaires Maïs

FICHE D'IDENTITÉ

- **SPECTRUM®** : marque déposée BASF
- Autorisation de vente N° : 9900251.
- Composition : 720 g/L dmtp-p.
- Formulation : concentré émulsionnable (EC).
- Usages autorisés : maïs : 1,4 L/ha en pré-levée et post-levée précoce (à partir de 1 feuille - Stade BBCH 11), millet et Môha : 1,2 L/ha en post-levée : 2-3 feuilles, Môha doux : 1,4 L/ha et Sorgho : 1,2 L/ha à partir de 3 feuilles des sorghos.
- Classement toxicologique :



H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

H302 : Nocif en cas d'ingestion.

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

• Nombre maximum d'applications par an : 1.

• Délai avant récolte (DAR) : maïs, millet, môha : 100 jours grain et 90 jours fourrage, Môha doux : 60 jours, sorgho : 90 jours.

• Distance aux points d'eau : respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 m.

• Délai de rentrée dans la culture : 48 heures après le traitement.

• Conditions d'emploi : pour les cultures entrant dans la rotation et pour lesquelles il n'existe aucune autorisation de préparation à base de dmtp-p, respecter un délai de 140 jours pour les céréales destinées à l'alimentation humaine.

• Protection de l'utilisateur lors de la manipulation des produits : gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquée S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.

• Conditionnement : bidon de 5 L (groupe par 4) - bidon de 20 L.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi, lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation.

BASAMAI - bentazone 480 g/L - Formulation SL - Autorisation de vente n°9100065 - H318 - H332 - H302 - H317 - H400 - H410
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Merlin® Flexx : 44 g/l isoxaflutole + 44 g/l cyprosulfamide - AMM n°2110111 - Xn - Nocif - N - Dangereux pour l'environnement - ® Marque déposée Bayer - Détenteur d'homologation : Bayer S.A.S - Bayer CropScience

Adengo® : 20 g/l thiencarbazone-méthyl + 50 g/l isoxaflutole + 33 g/l cyprosulfamide - AMM n°2110109 - Xn - Nocif - N - Dangereux pour l'environnement - ® Marque déposée Bayer - Détenteur d'homologation : Bayer S.A.S - Bayer CropScience

Informations techniques

BASF Agro [0810 02 30 33](tel:0810023033) ou www.agro.bASF.fr

Une question de santé

MSA [Phyt'attitude 0800 887 887](tel:0800887887)

En cas d'urgence (incident ou accident)

BASF Agro Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33

Collecte des emballages vides

ADIVALOR [0810 12 18 85](tel:0810121885) ou www.adivalor.fr

10 GESTES RESPONSABLES ET PROFESSIONNELS DE LA PULVÉRISATION

AVANT L'APPLICATION

- 1 Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
- 2 Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.
- 3 Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
- 4 Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
- 5 Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
- 6 Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve, ou utiliser l'incorporeur.

PENDANT L'APPLICATION

- 7 Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau. Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

APRÈS L'APPLICATION

- 8 Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
- 9 Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
- 10 Recycler les emballages dans le cadre des collectes **ADIVALOR**. Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande Osmofilm®. ® Marque déposée Sté PANTEK France

CONTACTS UTILES

Informations techniques

BASF Agro [0810 02 30 33](tel:0810023033) ou www.agro.bASF.fr

Une question de santé

MSA [Phyt'attitude 0800 887 887](tel:0800887887)

En cas d'urgence (incident ou accident)

BASF Agro Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33

Collecte des emballages vides

ADIVALOR [0810 12 18 85](tel:0810121885) ou www.adivalor.fr

Quand on utilise une valeur sûre pour protéger son maïs ça se voit... longtemps !



Spectrum®

Solution racinaire
www.agro.bASF.fr

BASF

The Chemical Company

DUFRENECORRIGANSCARLETT - Édition Novembre 2012 - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF Agro (0 810 02 30 33) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Avant toute utilisation de SPECTRUM s'assurer de son adéquation avec la filière de production et avec les recommandations officielles régionales. 704MAIHED1012R. Crédit photos : BASF.

BASF Agro S.A.S. - 21 chemin de la Sauvegarde - 69134 ECULLY cedex - Tel. 04 72 32 45 45 - www.agro.bASF.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.



Atout n° 1 Une efficacité multiple pendant 30 à 60 jours !

Intégrer Spectrum® dans vos programmes de pré-levée, c'est choisir la valeur sûre et ainsi :

- maîtriser les graminées les plus nuisibles dès la pré-levée,
- contribuer à gérer les levées échelonnées,
- optimiser l'efficacité des applications de post-levée grâce à son action complémentaire sur les dicotylédones, y compris sur les flores émergentes – comme la mercuriale.

Le dmta-p confère à Spectrum® des performances exceptionnelles

Une efficacité connue et reconnue sur PSD*

Spectrum® apporte un haut niveau d'efficacité sur les graminées les plus nuisibles, en particulier les PSD*


*PSD : différentes adventices du genre *Panic*, *Sétaire*, *Digitaria* (voir graphique ci-contre).

Une efficacité sur dicotylédones qui contribue au succès du désherbage

	Spectrum® (1,2 à 1,4)	Nbre essais
Pourpier	100	1
Spergule sp.	100	1
Véronique à feuilles de lierre	100	1
Arroche hâtive	99	2
Matricaire camomille	99	8
Matricaire inodore	99	1
Véronique de persée	99	10
Lamier pourpre	96	8
Géranium disséqué	95	1
Capucine bourse-à-pasteur	94	9
Renouée tomentueuse	92	1
Amarante réflechie	90	23
Ravenelle	90	4
Mouron des champs	87	5
Trefle	87	1
Funsterre officinal	85	1

Tres sensible (TS) > 95 % Sensible (S) 85-95 % Moyennement sensible (MS) 70-85 %


Peu sensible (PS) 50-70 % Très peu sensible (TPS) < 50 %



* Synthèse de tous les essais conduits dans diverses situations pédoclimatiques (de favorables à défavorables).

Une meilleure régularité d'action

L'efficacité de Spectrum® sur Panics, Sétaires et Digitaires est toujours plus régulière que la réf. 24. Comparaisons effectuées 50 à 60 jours après le traitement sur 30 essais. BASF Agro 2003 - 2012.




Atout n° 3 Une molécule à faible risque de transfert

- Dans le panel des chloroacétamides, le dmta-p affiche un profil plutôt favorable vis-à-vis de l'eau et un grammage réduit.
- Arvalis-Institut du Végétal a testé le dmta-p sur son site de La Jaillière (44) et il a été classé parmi les substances à **faible risque de transfert** (drainage et ruissellement).
- Dans une démarche de gestion responsable, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures de protection des ressources en eau :
 - respecter les **zones non traitées** par rapport aux points d'eau,
 - établir des **bandes enherbées** le long des cours d'eau et aussi à flanc de coteaux,
 - respecter des **périmètres autour des captages d'eau potable** (perspective « bon état de l'eau » 2015).

Spectrum®

Atout n° 2 La régularité, même en conditions difficiles...

De par ses caractéristiques physico-chimiques, le dmta-p se diffuse largement dans la solution (1) et dans la phase gazeuse du sol (2). Il est ainsi en contact étroit avec les adventices à détruire et peut donc **libérer sa puissance anti-graminées avec une très grande régularité**. Ces spécificités permettent au dmta-p d'être efficace à moins de 1000 g/ha et d'être qualifié de **molécule bioactive**.



Spectrum® est le seul herbicide qui apporte un haut niveau d'efficacité sur les graminées même quand les conditions climatiques sont moins favorables aux produits de pré-levée.

La biodisponibilité du dmta-p lui permet d'avoir une efficacité herbicide renforcée en conditions temporairement sèches.

Une application de Spectrum® sur sol frais ou suivie d'une précipitation d'au moins 10 mm dans les 10 jours, assure la meilleure efficacité.

Bonnes pratiques en post-semis pré-levée du maïs

- **Adapter la dose de Spectrum® en fonction du type de sol,**
 - Traiter quelques heures à quelques jours après le semis : sur sol humide ou suivi d'une irrigation ou d'une pluie (10 mm dans les 10 jours suivant le traitement),
 - Appliquer sur sol finement préparé,
 - Respecter une profondeur de semis de 3 cm minimum.

Type de sol	Sablo-limoneux, Limon profond, Limon argileux, Argileux, Argilo-limoneux, Argilo calcaire	Sableux, Limon battant
Type de matière organique	< 3% 1 L/ha	1,2 L/ha
	≥ 3% 1,2 L/ha	1,4 L/ha

Atout n° 4 Le partenaire anti-graminées de toutes les stratégies de désherbage

Les solutions de désherbage basées sur Spectrum® en pré-levée ou en post-levée précoce sont efficaces, sûres et validées au champ :

- Spectrum® est une solution racinaire dont la **persistence d'action s'étale sur plusieurs semaines (30 à 60 jours)**,
- **son effet racinaire est anti-germinatif** : Spectrum® agit en bloquant les adventices dès le plus jeune stade.

La stratégie dite « tout en pré-levée »

F	Panic, Sétaire, Digitaire, Chénopode, Amaranthe, Morelle, Mouron des Oiseaux	Spectrum® seul en pré-levée
L	+ Renouée des Oiseaux	Spectrum® 1 à 1.2L/ha + Atic Aqua 1.7 à 2 L/ha en pré-levée
O	+ Pensée	
R	+ Véronique	
E	+ Matricaire	
	+ Renouée Liseron	
	+ Ambroisie	Spectrum®+ Merlin Flexx ou Spectrum®+ Adengo
	+ Sanve, Ravenelle	

Cette stratégie permet de limiter très tôt la concurrence des adventices et permet un désherbage en un seul passage dans de très nombreuses situations.

La gestion des liserons devra se faire avec une intervention spécifique de post-levée. En cas de forte pression mercuriale, intervenir en post-levée avec un produit efficace.


La stratégie dite « pré-levée/post-levée »

F	Panic, Sétaire, Digitaire, Chénopode, Amaranthe, Morelle, Mouron des Oiseaux	Spectrum® en pré-levée suivie de...
L	+ Pourpier	- Tricétone ou autre Anti-Dicot
O	+ Pensée	- Tricétone + sulfonylurée
R	+ Véronique	
E	+ Matricaire	
	+ Géranium	Tricétone + Basamais 1 L/ha
	+ Ambroisie	Tricétone + Ravenelle
	+ Sanve	Tricétone + Bromoxynil
	+ Mercuriale	

Cette stratégie s'adresse aux flores complexes et aux situations avec fortes pressions d'adventices.

La stratégie dite « tout en post »

Le dmta-p en post-levée permet de régulariser l'efficacité des anti-graminées foliaires tout en accroissant la persistance d'action du désherbage.



66 essais BASF Agro 2004 à 2006 - Observations 30 jours après traitement.