

Désherber conjointement vivaces et dicots annuelles avec Conquérant®



Large spectre sur dicotylédones

Conquérant® présente un très large spectre d'activité sur **dicotylédones annuelles difficiles** et sur **dicotylédones vivaces** : le tritosulfuron et le dicamba font preuve d'une très bonne **complémentarité**.

→ Champ d'activité de Conquérant®
113 essais BASF Agro de 1999 à 2009

Conquérant®
0,4 Kg/ha

DICOTYLÉDONES CLASSIQUES

Amarante réfléchie	
Chénopodes sp.	
Morelle	
Renouée persique (et à f. de Patience)	

DICOTYLÉDONES DIFFICILES

Ambroisie	
Arroches sp.	
Datura	
Fumeterre officinal	
Gaillet gratteron	
Laïterons sp.	
Linaires sp.	
Mercuriale annuelle	
Pensée des champs	
Renouée des oiseaux	
Renouée liseron	
Véronique de Perse	

DICOTYLÉDONES DIVERSES

Capselle	
Colza (repousses)	
Lamier pourpre	
Maticaire camomille	
Mouron des champs	
Pourpier potager	
Ravenelle	
Sanve	
Séneçon	
Spergule des champs	
Stellaire	

DICOTYLÉDONES VIVACES

Chardon des champs*	
Liseron des champs*	
Liseron des haies	
Renouée amphibia	
Rumex sp.	

Niveaux d'efficacité attendus lorsque les conditions de mise en œuvre sont respectées (temps poussant, hygrométrie > 70%, adventices jeunes, etc).

* à confirmer

Très sensible (TS)	>95%
Sensible (S)	85-95%
Moyennement sensible (MS)	70-85%
Peu sensible (PS)	50-70%
Très peu sensible (TPS)	<50%




Redoutable sur vivaces




Supérieur à toutes les références sur liseron des haies

L'application fractionnée de Conquérant® donne les meilleurs résultats. Pour un résultat optimum, il est recommandé de traiter une première fois avec Conquérant® 0,2 Kg/ha avant le stade 6 feuilles du maïs puis de renouveler l'application de Conquérant® à la dose de 0,2 Kg/ha après le stade 8 feuilles.

APPLICATION UNIQUE (observation 45 jours après application)



APPLICATION FRACTIONNÉE (observation 30 jours après la seconde application)





Efficacité sur rumex remarquable

Sur rumex issu de graines ou jeunes rhizomes, et sur rumex souche, Conquérant® présente une très bonne efficacité du stade rosette à l'élongation de l'hampe florale.



Préconisations d'emploi



Conquérant® s'utilise en post-levée du maïs de 2 à 6 feuilles, puis à partir du stade 8 feuilles jusqu'au stade 10 feuilles du maïs. Les meilleures efficacités sont obtenues **sur des jeunes dicotylédones «2 cotylédons et 6 feuilles»** lorsque les conditions météorologiques sont favorables à une pousse active de la végétation. Les conditions chaudes et humides améliorent la rapidité d'action de Conquérant®. Son action est totale dans les 2 à 4 semaines qui suivent l'application. Dans le cadre des utilisations en mélange avec d'autres partenaires herbicides, la dose de Conquérant® doit être adaptée aux espèces rencontrées, à leurs stades de développement et aux conditions climatiques.

Doses recommandées sur flore vivace

Adventice	Dose de Conquérant®	Stades de l'aventice
Liseron des champs	0,4 L/ha	20 à 30 cm
Liseron des haies	0,4 L/ha	20 à 30 cm
Rumex de semis et de souches	0,4 L/ha	Du stade rosette à l'élongation de l'hampe florale
Chardon	0,4 L/ha	20 à 30 cm

Isard® / Spectrum® : 720 g/L dmpta-p - Autorisation de vente d'Isard® n°9900251 et de Spectrum® n° 2010617 - N Xn - R22-R36/38 - R43 - R50/53.
Dakota®-P / Beloga®-P / Wing®-P : 250 g/L pendiméthaine + 212,5 g/L dmpta-p - Autorisation de vente n° 2090113 - N Xn - R22 - R38 - R43 - R50/53.