

Fongicide céréales

Pack

Zoom® + Lybro® 5L + 2.5L

- Rendement sécurisé et large spectre d'efficacité
- Polyvalence blés et orges
- Raisonner sa protection fongicide pour plus de rentabilité



PERFORMANCE ET POLYVALENCE

blés



Septoriose

+++(+)



Rouille brune


+++(+)



Rouille jaune

+++(+)

orges



Helminthosporiose

+++




Rhynchosporiose

+++(+)



Ramulariose

+++(+)



Rouille naine

+++(+)

EFFICACITÉ ++++ Très bonne

SÉCURISER LE RÉSULTAT

Stade Dernière Feuille Etalée : le stade clé de la protection fongicide des céréales



- + Large spectre d'efficacité
- + Protection et rendement sécurisés
- + Gestion des risques résistances



ZOOM®,
nouveau 2022 à base de **REVYSOL®**

- Economie ou réduction du T1 septoriose en blés
- Intégration de produits de biocontrôle (en T1)
- Performance sur ramulariose en orges

SIMPLIFIER LES CHANTIERS DE PULVÉRISATION


Atout IFT

ZOOM® + LYBRO® 0.65 +0.33 l/ha = 0.72 IFT


Préventif ou curatif : une bonne efficacité des fongicides passe par une application avant l'apparition des symptômes

RECOMMANDATIONS

blés



orges



Indépendant des imprévus climatiques

■ Contrôle des contaminations latentes en incubation dans la feuille
Grande activité curative*

■ Gestion des contaminations tardives
Persistance d'action remarquable

■ A l'abri du lessivage dès séchage de la bouillie

■ Efficace même par temps froid (dès 5°C)*

*ne constitue pas une recommandation d'utilisation

DOSAGE FACILE : ratio 2 pour 1

1 pack
7.1 à 7.7 ha
pour les blés

QU'EST-CE QUE LE PACK ZOOM® + LYBRO® 5L + 2.5L ?

	ZOOM®	LYBRO®
AMM	N° 2210568	N°2100151
Composition	66.7 g/L mefenentrifluconazole* + 63.3 g/L fluxapyroxad** *nom d'usage Revysol **nom d'usage Xemium	200 g/L pyraclostrobine
Formulation	EC (Concentré Emulsionnable)	EC (Concentré Emulsionnable)
Cultures et usages autorisés	Blés (blé, triticale, épeautre) : septoriose, rouille(s) Orge : rhynchosporiose, helminthosporiose et ramulariose Seigle : rhynchosporiose, rouilles	Blés, triticale, épeautre : rouille (s) Orge : helminthosporiose, rhynchosporiose, rouille(s) Avoine : rouille couronnée Seigle : rhynchosporiose, rouille(s)
Dose autorisée	1,5 L/ha	1,1 L/ha
ZNT Aquatique	5 mètres	5 mètres pour 1 application, 20 mètres pour 2 applications
ZNT Arthropodes		5 mètres
ZNT personnes présentes et résidents	5 mètres	5 mètres
Nombre max. d'application/ ha /an	1/an (Entre BBCH 30 et 69)	2 (sauf helminthosporiose orge 1/an)
DAR	35 jours	35 jours
DRE	48 H	48 H

Pour toutes informations techniques, nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299 Service & appel gratuits

Protection de l'utilisateur pendant la préparation de la bouillie:
gants NF EN ISO 374-1 réutilisables EN16523+1/A1 (type A), EPI Vestimentaire conforme à la norme EN ISO 27065/A1, demi-masque filtrant antiaérosol (EN 149) de classe FFP3 ou demi-masque (EN 140) avec filtre antiaérosol (EN 143) de classe P3

Ce pack est utilisable pour lutter contre les maladies sur lesquelles les deux produits sont autorisés (usages communs), ou pour lutter contre un complexe maladies où l'un/et ou l'autre sont homologués sur des pathogènes distincts (usages différents).

BASF France SAS - Division Agro - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. N° d'agrément : IF02022 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Détenteur d'homologation : BASF. ® Marque déposée BASF. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.bASF.fr et/ou www.phytodata.com. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Vert qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Référence du document : 980CFE1021R - Septembre 2021.

Zoom® : SGH05, SGH07, SGH09 - DANGER - H315 : Provoque une irritation cutanée - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H318 : Provoque des lésions oculaires graves - H332 : Nocif par inhalation - H335 : Peut irriter les voies respiratoires - H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel - H411 : Toxique pour les organes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement - **SPe 8 : Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas utiliser en présence d'abeilles et autres polliniseurs, ne pas appliquer durant la période de floraison.**

Lybro® : SGH07, SGH08, SGH09 - DANGER - H302 : Nocif en cas d'ingestion - H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion - H315 : Provoque une irritation cutanée - H317 : Peut provoquer une allergie cutanée - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux - H332 : Nocif par inhalation - H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme - EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement



SGH 05 SGH 07 SGH 08 SGH 09

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.