



Marques déposées BASF - Walabi ® - Autorisation de vente n° 9300557 - 150 g/l pyriméthanil + 375 g/l chlorothalonil - N : Dangereux pour l'environnement - Xn : nocif - R36 : irritant pour les yeux - R40 : effets cancerogènes suspectés, preuves insuffisantes - R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau - R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques - Formulation : SC - Doses : Pois protéagineux d'hiver et de printemps, pois de conserve : 2 L/ha - DAR : pois de conserve : 14 jours - Distance aux points d'eau : Respecter une zone non traitée de 50 mètres - Délai de rentrée : 48 heures - Sunorg ® Pro - Autorisation de vente n°2010326, Caramba ® Star - Autorisation de vente n°2010280 - 90g/L metconazole - Xn : nocif - AQUA : dangereux pour les organismes aquatiques - R63 : risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant - Formulation : SL - Doses : Pois protéagineux d'hiver et de printemps, pois de conserve, féverole : 0,8L/ha - 2 applications maximum par an - DAR : pois de conserve : 14 jours (cf. arrêté du 12/09/06) - Distance aux points d'eau : Respecter une zone non traitée de 5 mètres (cf. arrêté du 12/09/06) - Délai de rentrée : recommandation BASF : 6 heures (cf. arrêté du 12/09/06) - Magéos ® MD - Autorisation de vente n°9700278, Clameur ® - Autorisation de vente n°9700392 - N : Dangereux pour l'environnement - Xn : nocif - R22 : Nocif en cas d'ingestion - R37 : Irritant pour les voies respiratoires - R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique - Le port de gants est recommandé lors de la préparation - SPe8 : Dangereux pour les abeilles ne pas appliquer sur les cultures en période de floraison. Ne pas utiliser quand les abeilles butinent activement. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleurs sont présentes. Limiter le nombre d'applications à 2 par an, par espèce d'insectes et alterner avec des s.a. à mode d'action différent - Formulation : WG - Doses : Pois protéagineux d'hiver et de printemps, pois de conserve : 0,08 kg/ha - Nombreuses autres homologations - DAR : pois de conserve et pois protéagineux : 14 jours - Distance aux points d'eau : Respecter une zone non traitée de 5 mètres - Délai de rentrée : 6 heures (8 heures sous abris). Dangereux - Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Lorsqu'une protection doit être réalisée avec des spécialités de la famille des pyréthrinoïdes et des triazoles ou imidazoles, traiter d'abord avec la spécialité à base de pyréthrinoïdes puis avec la triazole ou l'imidazole en respectant un délai de 24h entre les deux applications.

Édition d'août 2010 - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF Agro (08 10 02 30 33 - Prix appel local) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. 973POIFGED0810R

# Walabi®

## En première ligne pour défendre le pois



À la floraison,  
mieux vaut un partenaire  
de taille quand on veut  
faire le pois.



À chaque stade  
de la culture du pois,  
une réponse de spécialiste.  
[www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr)

**BASF**  
The Chemical Company

**BASF**  
The Chemical Company

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS :**  
**RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI**

# LA FLORAISON

Préserver le potentiel  
jusqu'à la récolte

## POURQUOI TRAITER À LA FLORAISON ?

La floraison des pois intervient entre les mois de mai et juin en fonction des régions et des variétés. À cette période, le climat est favorable aux attaques fongiques ainsi qu'au développement des insectes.



Botrytis



Rouille

## LES MALADIES DU POIS

Maladie	Organes attaqués	Impact	Commentaires
Botrytis	Feuilles, gousses, tiges (mort du pied possible)	10 à 20 q/ha	Attention aux conditions humides
Anthracnose	Feuilles et gousses	10 à 25 q/ha	Maladie très fréquente
Rouille	Feuilles	10 q/ha	Maladie de fin de cycle, plutôt localisée à l'Est du bassin parisien

Dans la suite du document, les gains nets sont calculés sur la base de 25 €/q pour le pois et 10 € par passage de tracteur.

## LES INSECTES

- Les pucerons affaiblissent la plante par prélèvement de sève et par transmission de viroses.
- La tordeuse du pois est un papillon dont la chenille pénètre dans la gousse et dévore les graines.



Tordeuse



# LA FLORAISON

Résultats,  
préconisations

## ESSAIS À DOMINANTE ANTHRAACNOSE (DOUBLE APPLICATION)



Anthracnose



## BASF : DES SOLUTIONS CONTRE L'ANTHRAACNOSE



Puceron vert

Ravageur	Seuil d'intervention	Solution
Pucerons	20-30 pucerons par tige	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surveiller régulièrement</li> <li>Traiter en début d'infestation</li> <li>Utiliser Magéos® MD / Clameur® à 80 g/ha</li> </ul>
Tordeuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seuil cumulé de 400 captures d'adultes</li> <li>Traitement durant la floraison</li> <li>Renouveler si nécessaire</li> </ul>	

# Walabi®

le produit réellement efficace  
contre l'anthracnose et le botrytis

## WALABI® A UNE ACTIVITÉ TRANSLAMINAIRE QUI LUI PERMET

- D'agir de l'intérieur
- De résister au lessivage

Ainsi, ses avantages font de Walabi® le fongicide le plus rentable sur ce marché.

## LES POINTS FORTS

Walabi® associe le pyriméthanal au chlorothalonil pour une efficacité maximale\* contre les deux principales maladies du pois que sont l'anthracnose et le botrytis.

Le pyriméthanal bénéficie d'un "effet vapeur" et ainsi agit contre les maladies dans l'ensemble de la masse végétale.

\* Walabi® est le seul produit crédité de "bonne efficacité" à la fois sur anthracnose et sur botrytis par Arvalis-institut du végétal.

## RENTABILITÉ OPTIMISÉE PAR UN POSITIONNEMENT DÉBUT FLEUR

### INTÉRÊT DE L'EFFET VAPEUR DU PYRIMÉTHANIL : EXEMPLE SUR ANTHRACNOSE




Anthracnose

#### Efficacité sur les étages foliaires supérieurs




#### Au-dessus du 1<sup>er</sup> étage florifère

30% d'attaque sur témoin



#### Efficacité sur les étages foliaires inférieurs



Moyenne de 9 essais - 2 traitements :  
début fleurs puis 15-20 jours plus tard

## WALABI® AGIT PARTOUT DANS LA MASSE DE VÉGÉTATION