


RÉUSSISSEZ VOTRE COLZA - REPRISE DE VÉGÉTATION • RÉUSSISSEZ VOTRE COLZA - REPRISE DE VÉGÉTATION

Régulateur colza





The Chemical Company

Cinch® Pro, l'étalon des régulateurs colza



Pourquoi Cinch® Pro ?

- **Une excellente efficacité pour contrôler la verse.**



- **Une souplesse d'emploi de C2 à D2**
supérieure à celle de la référence régulateur (C2-D1).

- **Un puissant effet fongicide sur cylindrosporiose, oïdium et les attaques tardives de phoma.**




Cylindrosporiose

Maladie majeure sur certaines variétés sensibles.
A contrôler dès la reprise de végétation
pour ne pas laisser envahir plusieurs étages foliaires.



Oïdium

Essentiellement Sud
de la France.




Cinch® Pro: le régulateur qui donne plus de rendement.



- Maturité plus homogène, moins d'égrenage, moins d'humidité et d'impuretés.
- Récolte et traitements plus faciles.
- Plus de ramifications, plus de siliques.
- Plante saine.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI



L'étalon des régulateurs colza

Cinch® Pro


A qui s'adresse-t-il ?

- Aux colzaïculteurs qui recherchent à la reprise de la végétation en un seul passage :
 - un régulateur qui se suffit à lui-même,
 - une excellente protection fongicide sur cylindrosporiose, oïdium et attaques tardives de phoma,
 - et surtout un meilleur rendement.

Comment s'utilise-t-il ?

● À la reprise de végétation stades C2 à D2

- Risque verse fort et/ou risque maladies comme cylindrosporiose, oïdium... : dose 0,8 L/ha (sans adjuvant).
- Risque verse faible à moyen et/ou risque maladies comme cylindrosporiose, oïdium... : dose 0,6 à 0,7 L/ha (sans adjuvant).



● À l'automne stade 4 à 6 feuilles (8 feuilles maximum)

- Risque d'élongation prématûre du bourgeon terminal (semis trop dense, azote disponible trop important, temps poussant) et/ou risque phoma, cylindrosporiose, oïdium... : dose 0,4 L/ha (4 feuilles) à 0,6 L/ha (à partir de 6 feuilles) (sans adjuvant) selon le stade du colza.
- Sur phoma, appliquer Cinch® Pro, lors des phases de contamination, en suivant les avertissements agricoles de la Protection des Végétaux.

L'étalon qui vous en donne + sur colza



Qu'est-ce que Cinch® Pro ?

- Marque déposée BASF : Cinch® Pro
- Autorisation de vente n° 2010283
- Composition : 90 g/L de metconazole
- Formulation : concentré soluble
- Usages et doses autorisées sur crucifères oléagineuses :
 - Sclerotiniose, alternariose, cylindrosporiose, oïdium : 0,8 L / ha
 - Phoma : 0,6 L / ha
 - Régulation de la croissance : 0,8 L / ha
- Classement toxicologique : Xn - R63 - AQUA
- Délai avant récolte - DAR : Colza 45 jours

- Distance aux points d'eau : non définie. Respecter une zone non traitée minimale de 5 mètres (cf Arrêté du 21/09/2006)
- Délai de rentrée : 6 heures (cf Arrêté du 1/09/2006)
- Autres autorisations : Blés, orges, seigle, avoine, triticale, pois protéagineux, féveroles, lupins, pois de conserve et lin.
- Contre indication éventuelle sur faune auxiliaire et abeilles : l'association de Cinch® Pro avec un insecticide de la famille des pyréthrinoïdes n'est pas autorisé durant la floraison et les périodes de production d'exudats. Il faut obligatoirement traiter avec la spécialité à base de pyréthrinoïde en premier et laisser un délai de 24 heures minimum entre les deux applications.

BASF Agro S.A.S. - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex - Tél. 04 72 32 45 45

Retrouvez l'ensemble de nos informations produits sur : www.bASF-agro.fr N°Azur 0 810 02 30 33

PRIX APPEL LOCAL