

# Devin® + Dash® HC, l'anti-graminées boosté



## Pourquoi Devin® + Dash® HC ?

### ● Le spectre complet

Contre les graminées annuelles et vivaces :

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Bromes       | Repousses de céréales |
| Chiendent    | Sétaire               |
| Digitaire    | Sorgho d'Alep         |
| Folle-avoine | Vulpin                |
| Panic        |                       |
| Ray-grass    |                       |

### ● La polyvalence


- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Betterave         | Pois de conserve  |
| Carotte           | Pois protéagineux |
| Colza             | Pomme de terre    |
| Epinard           | Soja              |
| Haricot           | Tournesol         |
| Lin textile       | Trèfle violet     |
| Luzerne           |                   |
| Maïs DUO System™* |                   |

\* Maïs DUO System™ : uniquement sur variétés sélectionnées résistantes à Devin® : reconnaissables par le suffixe DUO adjoint au nom de la variété.

### ● La sécurité

Devin® est connu pour sa rapidité d'action. Il est mis à l'abri du lessivage dans l'heure qui suit le traitement et en moins d'une semaine, les premiers symptômes sont visibles.


- + de rapidité d'action
- + d'efficacité
- + de régularité




**Devin®  
Dash® HC**

## ● Une efficacité accrue et plus régulière sur les graminées du colza et des cultures de printemps.

### Colza : Devin® + Dash® HC supérieur à la référence



### Cultures de printemps : Devin® + Dash® HC supérieur à la référence



■ Devin® 1L/ha + Dash® HC 1L/ha ■ Réf. 4 ■ Devin® 2L/ha + Dash® HC 2L/ha

## Comment s'utilise-t-il ?

### ● C'est simple, c'est sûr.

	Stades	Devin®	+	Dash® HC
Graminées annuelles	3 feuilles à début tallage	1 L/ha	+	1 L/ha
	Tallage à montaison	1,2 L/ha	+	1,2 L/ha
Graminées vivaces	Pousse de 10 à 20 cm	2 L/ha	+	2 L/ha

En culture de betterave, sur graminées annuelles (1-3 feuilles), Devin® + Dash® HC peut s'utiliser à 0,8 L/ha + 0,8 L/ha en double application.

Les meilleures efficacités sont obtenues en traitant à un stade jeune des graminées adventices (avant plein tallage) et en conditions poussantes (hygrométrie et temps doux). En culture de betterave, il est recommandé de ne pas mélanger Devin® et Dash® HC avec un autre herbicide post-levée.

## Qu'est-ce que Devin® + Dash® HC ?

**Devin® HC et Dash®** : marques déposées BASF.

### Autorisation de vente :

- Devin : n°9800085
- Dash HC n°9400478

### Composition et formulation :

- Devin® : 100g/L cycloxydime en formulation liquide EC
- Dash® HC : 22,5% ester de phosphate d'alcool gras polyoxyalkylés, 37,5% esters méthyliques d'acide gras, 5% acide oléique en formulation liquide.

### Doses et usages autorisés :

- Devin® : 2L/ha contre les graminées annuelles, 4L/ha contre les graminées vivaces (sauf épinard) sur de nombreuses cultures, se reporter à l'étiquette
- Dash® HC : 2L/ha, adjuvant pour bouillie herbicide

### Classement toxicologique :

- Devin® : Xi – R38
- Dash® HC: Xi – R38

### Conditionnement :

Emballage regroupant 5L de Devin® et 5L de Dash® HC.

### Délai avant récolte :

Stratos® Ultra : tomate et choux : 60 jours; épinard et PPAM : 42 jours; maïs grain et pavot : 90 jours; maïs fourrage 70 jours; asperge : 200 jours; féverole : 56 jours.

### Distance aux points d'eau :

respecter une zone non traitée minimale de 5 mètres (arrêté du 21/09/2006).

### Délai de rentrée :

non établi, préconisation BASF : 24 heures.

### Préparation de la bouillie :

Verser Dash® HC en premier.

Avec un bac incorporateur, verser Dash® HC dans le bac vide sans ajouter d'eau, aspirer le produit, puis rincer le bac incorporateur et le bidon à grande eau.