

Herbicides



© Marques déposées BASF. Stratos® Ultra : 100 g/L de cycloxydim. Autorisation de vente n° 9000490. Xi - R38. Dash® HC : 22,5 % esters de phosphate d'alcools gras polyoxyalkyles + 37,5 % esters méthyliques d'acides gras + 5 % acide oléique. Autorisation de vente n° 9400478. Xi - R38. Novall® : 400 g/L de métazachlore + 100 g/L de quinnéac. Autorisation de vente n° 9000833. Xi, R36/38 - R43 AQUA. Nimbus® : 250 g/L de métazachlore + 33 g/L de clomazone. Clomazone : matière active FMC Corporation. Autorisation de vente n° 9800187. Xi, R43 AQUA. Zebra® : 250 g/L de métazachlore + 33 g/L de clomazone. Clomazone : matière active FMC Corporation. Autorisation de vente n° 2000085. Xi, R43 AQUA. Butisan® S : 500 g/L de métazachlore. Autorisation de vente n° 8100291. Xn, R22 - R36/38 - R43.

Fongicides - Régulateurs



© Marques déposées BASF. Caramba® Star : 90g/L de metconazole. Autorisation de vente n° 2010280. Xn, R63 - AQUA. Sunorg® Pro : 90g/L de metconazole. Autorisation de vente n° 2010326. Xn, R63 - AQUA. Pictor® Pro : 50% de boscalid. Autorisation de vente n°2050075. N, R51, R53.

Insecticides



© Marques déposées BASF. Mageos® MD : autorisation de vente n°9700278. Composition : 15% d'alphaméthrine. Classement : non classé. AQUA. Clameur® MD : autorisation de vente n°9700392. Composition : 15% d'alphaméthrine. Classement : non classé. AQUA.

Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi.

9 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION

1

Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.

2

Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi.

3

Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).

4

Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.

5

Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).

6

Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor.

PENDANT L'APPLICATION

7

Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

APRÈS L'APPLICATION

8

Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.

9

Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.

Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 ou www.basf-agro.fr <small>PRIX APPEL LOCAL</small>
Une question de santé	MSA	N° Vert 0 800 887 887 <small>APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE</small>
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0810 12 18 85 ou www.adivalor.fr <small>PRIX APPEL LOCAL</small>

Edition de juin 2007 - annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès de n° Azur BASF Agro (0 810 023 033) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Photos et illustrations : BASF, Y. Givreau, Kuhn, X. Chabert, BASF 172/DBE, 284/COLTRED0306R.

Réussissez
votre colza

• Le semis et l'implantation

• La reprise de végétation

• La floraison

Le colza, culture d'avenir

BASF
The Chemical Company

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI

