

# Novall<sup>®</sup>

## le grand désherbant complet dès la pré-levée



### Pourquoi Novall<sup>®</sup> ?

#### ● Plus d'efficacité :

- Novall<sup>®</sup>, c'est un très large spectre d'efficacité sur les principales dicotylédones et graminées du colza.
- Novall<sup>®</sup>, c'est aussi un niveau d'efficacité inégalé sur gaillet, adventice n°1 du colza, sur les ombellifères (ammi élevé, carotte sauvage), sur vulpin et ray-grass, graminées de plus en plus difficiles à contrôler dans les rotations céréalières.

#### Dicotylédones

- Alchémille
- Ammi élevé
- Arabette
- Capselle bourse à P.
- Carotte sauvage
- Céraiste
- Coquelicot
- Euphorbe sp.
- Fumeterre
- Gaillet gratteron
- Laiteron sp.
- Lamier pourpre
- Lierre terrestre
- Matricaire
- Miroir de vénus
- Myosotis des champs
- Séneçon vulgaire
- Shérardie
- Stellaire
- Tabouret des champs
- Véronique des champs
- Véronique de Perse

100 à 90%

- Chénopode
- Ethuse
- Rapistre
- Renoncule des champs
- Véronique feuilles de lierre

90 à 80%

- Amaranthe réfléchie
- Anthrisque
- Barbarée
- Géranium à feuilles rondes
- Géranium à tiges grèles
- Lampsane commune
- Scandix
- Torilis

80 à 65%

- Géranium à feuilles disséquées
- Mercuriale
- Pensée
- Ravenelle
- Sanve
- Valérianelle

&lt; 65%

#### Graminées

- Pâturin annuel
- Vulpin
- Ray-grass

100 à 90%

- Folle-avoine

80 à 65%

- Brome stérile
- Repousses blé
- Repousses orge

&lt; 65%



Gaillet



Vulpin



Matricaire



Ray grass

#### ● Plus de sécurité :

- Novall<sup>®</sup> est utilisable sur toutes les variétés de colza.
- Novall<sup>®</sup> respecte les cultures suivantes. De très nombreuses cultures sont possibles en cas de retournement pour une cause accidentelle (limace, sécheresse) : betterave, maïs, pommes de terre, pois, sorgho, colza de printemps, lin, tournesol, soja, haricot, chou, féverole de printemps sans précaution particulière. Après labour et semis un peu plus dru : blé tendre, blé dur, orge d'hiver ou orge et blé tendre de printemps, luzerne.

## Pourquoi Novall® ?


### ● Plus de liberté :

Utilisable seul, en programme, en pré-levée ou en post-levée précoce du colza. Novall® s'adapte aux contraintes de l'agriculteur.


### ● Plus de rentabilité :

Novall®, c'est :

- plus de rendement,
- une récolte de qualité (impuretés, humidité, glucosinolates),
- une moisson plus facile,
- une parcelle propre favorable à l'ensemble de la rotation.



## Comment s'utilise-t-il ?



Seules les fortes infestations de repousses de céréales nécessiteront l'application d'un antigraminées de post-levée (type Stratos® Ultra + Dash® HC). En cas de forte pression de géraniums, Novall® peut s'utiliser en programme avec un produit de pré-semis (ex : napropamide, conditions optimales d'utilisation : pré-semis incorporé à 2-4 cm). Dans les régions où la trifluraline (2,5 L/ha de produit commercial) est appliquée en pré-semis incorporée (8 à 10 cm) Novall® s'utilise de 1,8 à 2,5 L/ha.

## Qu'est-ce que Novall® ?

### Composition :

Métazachlore (400 g/L) + quinmérac (100 g/L).

### Formulation :

Suspension concentrée.

### Dose autorisée :

Sur colza : 2,5 L/ha.

Sur tournesol : 2 L/ha.

### Mode d'action :

Il inhibe la germination des graines. Principalement absorbé par les racines et l'hypocotyle des adventices, Novall® présente également une part d'absorption foliaire valorisable dans les traitements de post-levée précoce.

