

Fongicide colza

BASF
The Chemical Company

Sunorg® Pro, l'excellence fongicide à la floraison




floraison
régions nord
fongicide
sclerotinia
alternaria

Pourquoi Sunorg® Pro ?

● Sans carbendazime, la solution pour alterner les modes d'action face au sclerotinia en situation de résistance.


- Une protection rentable grâce à des gains de rendement réguliers.



2 essais BASF (sclerotinia résistant carbendazime)




SCLÉROTINIA :
efficacité et gain de rendement
2 essais BASF 2003
(sclerotinia résistant carbendazime)



6 essais BASF



ALTERNARIA :
une excellente efficacité




3 essais BASF (application à l'apparition des symptômes)



OÏDIUM :
(essentiellement sud de la France)
efficacité et gain de rendement
3 essais BASF 2003
(application à l'apparition
des symptômes)

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI



L'excellence fongicide à la floraison

Sunorg® Pro


A qui s'adresse-t-il ?

● Aux agriculteurs :

- des régions nord qui recherchent un fongicide efficace sur sclerotinia et alternaria pour alterner les modes d'action fongicide,
- qui recherchent un fongicide multiculture.

Comment s'utilise-t-il ?

- 0,8 L/ha
- Contre sclerotinia, traiter à la chute des premiers pétales
- Contre alternaria, traiter à l'apparition des premières taches sur siliques.
- Contre oïdium, traiter dès l'apparition des premiers symptômes.



Sunorg® Pro

L'étalon qui vous en donne + sur colza



Qu'est-ce que Sunorg® Pro ?

- **Autorisation de vente** n° 2010326
- **Composition** : 90 g/L de metconazole
- **Formulation** : concentré soluble
- **Usages et doses autorisées sur crucifères oléagineuses :**
 - Sclerotiniose, alternariose, cylindrosporiose, oïdium : 0,8 L / ha
 - Phoma : 0,6 L / ha
 - Régulation de la croissance : 0,8 L / ha
- **Classement toxicologique :**
 - Xn
 - R63 : Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant
- **AQUA** : Dangereux pour les organismes aquatiques
- **Nombre maximum de traitement par saison** : 2
- **Délai d'emploi avant récolte - DAR** : Colza 45 jours
- **Distance par rapport au point d'eau - ZNT** : Non fixée, recommandation BASF Agro : 5 mètres
- **Délai de réentrée dans les parcelles** : Non fixé, recommandation BASF Agro : 6 heures
- **Autres autorisations** : Blés, orges, seigle, avoine, triticale, pois protéagineux, féveroles, lupins, pois de conserve et lin.

BASF Agro S.A.S. - 21, chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex - Tél. 04 72 32 45 45

Retrouvez l'ensemble de nos informations produits sur : www.bASF-agro.fr N°Azur 0 810 02 30 33

PRIXT APPEL LOCAL