

## Pourquoi choisir Bellis®



## Double action contre les maladies fongiques

- Efficacité élevée contre oïdium, maladies de conservation, stemphylose.

## Large champ d'efficacité contre les maladies de conservation des pommes et des poires, afin de :

- Maximiser la récolte commercialisable
- Préserver la qualité des fruits
- Maîtriser un grand nombre de champignons parasites des fruits, y compris *Phytophthora sp*, maladie préjudiciable, jusque-là sans solution.

Maladies	Bellis®
<i>Gloeosporium spp</i> (dont <i>Pezicula alba</i> )	Très bonne ou bonne
<i>Botrytis sp</i>	Très bonne ou bonne
<i>Phytophthora spp</i>	Très bonne ou bonne
<i>Penicillium sp</i>	Très bonne ou bonne
<i>Monilia spp</i>	Très bonne ou bonne

Maladies	Bellis®
<i>Alternaria sp</i>	Très bonne ou bonne
Tavelure ( <i>Venturia spp</i> )	Très bonne ou bonne
Oïdium ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	Moyenne ou irrégulière
<i>Stemphylium sp</i>	Faible ou nulle

## Deux modes d'action différents contre les maladies (QoI + SDHI)

- Meilleure gestion de l'efficacité à long terme des fongicides

## A l'abri du lessivage par les pluies

- Inutile de renouveler la protection jusqu'à 40-50 mm de pluies cumulées.



Contre toutes les maladies de conservation, y compris le *Phytophthora*, l'efficacité de Bellis® s'écrit en toutes lettres.



## Bellis®, usages et doses

Usages, doses autorisées, nombre maximum de traitements par an, délai d'emploi avant récolte (DAR) et zone non traitée par rapport aux points d'eau (ZNT).

Culture de référence	Cultures rattachées (cultures sur lesquelles le produit est utilisable)	Cible (maladies visées)	Doses	Nbre max d'appli.	DAR	ZNT
Pommier	Pommier, poirier, cognassier, nashi	Maladies de conservation - ( <i>Neofabraea alba</i> = <i>Pezicula alba</i> , <i>Phytophthora sp</i> , <i>Sporotrichum pomi</i> ( <i>Venturia inaequalis</i> ), <i>Penicillium sp</i> , <i>Monilia fructigena</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Alternaria sp</i> )	0,08 kg/hl	2	7 j	50 m
		Oïdium(s) - ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	0,08 kg/hl	3		
	Poirier, cognassier, nashi	Stemphylose ( <i>Stemphylium vesicarium</i> )	0,08 kg/hl	3		

## Nombre maximum d'applications :

sur l'ensemble de la saison, limiter à 3 le nombre total de traitements avec Bellis®, tous usages confondus sans dépasser 2 applications contre les maladies de conservation. Respecter un délai de 8 à 12 jours entre 2 applications.



## Bellis®, fiche d'identité

- **Bellis®** : Marque déposée BASF
- **AMM** : N° 2080070
- **Composition** : 128 g/kg de pyraclostrobine + 252 g/kg de boscalid
- **Formulation** : granulés dispersables (WG)
- **Emballage** : bidon de 5 kg
- **Classement toxicologique** :



ATTENTION

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H302 Nocif en cas d'ingestion

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- **Limite maximale de résidus** : consulter le site : [http://ec.europa.eu/sanco\\_pesticides/public/index.cfm](http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm)

- **Délai de rentrée** : 6 heures

- **Protection de l'utilisateur lors de la préparation** : gants en nitrile EN374, bottes, combinaison de travail polyester/coton (65%/35%) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

### ■ Recommandations :

Respecter les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé.

Bellis® - marque déposée BASF - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF (0810023033) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et/ou animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou consulter [www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr) et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com). BASF France SAS - Division Agro - 21, Chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. 728ALFE1215R - Février 2016.

## 10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

### AVANT L'APPLICATION

-  1 Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
-  2 Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.
-  3 Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
-  4 Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
-  5 Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
-  6 Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve, ou utiliser l'incorporateur.

### PENDANT L'APPLICATION

-  7 Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau. Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

### APRÈS L'APPLICATION

-  8 Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
-  9 Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
-  10 Recycler les emballages dans le cadre des collectes ADIVALOR. Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF France S.A.S-Division Agro recommande Osmofilm®. ® Marque déposée Sté PANTEK France

## Contacts utiles

Informations techniques Étiquettes et FDS	BASF France S.A.S Division Agro	 N°Azur 0 810 02 30 33 <small>PAI APPEL LOCAL</small> ou <a href="http://www.agro.bASF.fr">www.agro.bASF.fr</a>
Une question de santé	MSA	 Phyt'attitude  N°Vert 0 800 887 887 <small>APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE</small>
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF France S.A.S Division Agro	Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	 N°Azur 0 810 12 18 85 <small>PAI APPEL LOCAL</small> ou <a href="http://www.adivalor.fr">www.adivalor.fr</a>

# Bellis®

Contre oïdium  
du pommier, maladies  
de conservation des  
pommes et des poires,  
stemphyliose du poirier.

[www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr)

 **BASF**

We create chemistry

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**