

## Prévention de la résistance

Afin de limiter le risque d'apparition ou de développement d'adventices résistantes, nous recommandons d'alterner ou d'associer, sur une même parcelle, des herbicides avec des modes d'action différents, tant au cours d'une saison culturelle que dans la rotation.

### Canopia®

- Marque déposée BASF : CANOPIA®
- N° d'AMM : 2140261
- Composition : 54 g/kg de florasulam + 714 g/kg de tritosulfuron ; WG
- Mention d'avertissement : Attention H302 : nocif en cas d'ingestion H400 : très toxique pour les organismes aquatiques H410 : très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- Usages et doses autorisés : toutes céréales à 0,07 kg/ha (blé tendre d'hiver, blé tendre de printemps, blé dur d'hiver, blé dur de printemps, triticale, épeautre, orge d'hiver, orge de printemps, avoine, seigle). Canopia® est inscrit sur la liste des spécialités phytopharmaceutiques recommandées sur orges de brasserie d'hiver et de printemps élaborée par Malteurs de France et Brasseurs de France.
- Nombre max d'application : 1
- Stades d'application : BBCH 13-39 (sortie d'hiver et printemps)
- DAR : couvert par les conditions d'emploi
- ZNT / eau : 5 m
- DRE : 6h

Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone adjacente non cultivée.

Ne pas planter de cultures de type « légumes fruits » sur une parcelle de céréales préalablement traitée avec Canopia® ou toute autre préparation contenant du tritosulfuron. Légumes fruits : tomate, aubergine, concombre, courgette, cornichon, autres cucurbitacées à peau comestible, melon, potiron, pastèque, potimarron, autres cucurbitacées à peau non comestible, poivron, piment et maïs doux.

**Protection utilisateur lors de la préparation de la bouillie :** gants en nitrile EN374, bottes, combinaison de travail polyester/coton (65% / 35%) déperlante, blouse Cat. III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

## 10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

### AVANT L'APPLICATION

- 1 Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
- 2 Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.
- 3 Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
- 4 Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
- 5 Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
- 6 Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve, ou utiliser l'incorporateur.

### PENDANT L'APPLICATION

- 7 Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau. Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

### APRÈS L'APPLICATION

- 8 Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
- 9 Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
- 10 Recycler les emballages dans le cadre des collectes ADIVALOR. Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF France - Agro recommande Osmofilm®.  
® Marque déposée Sté PANTEK France

### CONTACTS UTILES

Informations techniques FDS	BASF France-Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 ou <a href="http://www.agro.bASF.fr">www.agro.bASF.fr</a>
Une question de santé	MSA	Phyt'attitude N°Vert 0 800 887 887 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF France-Agro	Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0 810 12 18 85 ou <a href="http://www.adivalor.fr">www.adivalor.fr</a>

Couverture : © Stéphanie Bambaud

Herbicide céréales de sortie d'hiver et de printemps

[www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr)



**Canopia®,  
anti-gaïlets à  
spectre large**

**Ne laissez  
pas les dicots  
vous envahir**

**BASF**  
We create chemistry

Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer auprès du N° Azur de BASF qu'il dispose bien de la dernière version de ce document.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.

Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou [www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr) et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com) - Juin 2015 - 514CEHE0715R.

**BASF France S.A.S. Division Agro - 21 chemin de la Sauvegarde - 69134 ECULLY cedex - Tel. 04 72 32 45 45 - [www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr)**

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**



# Canopia®, anti-gaillet à spectre large

Ne laissez  
pas les dicots  
vous envahir

## LES BÉNÉFICES DE CANOPIA®

- Un seul herbicide pour traiter gaillets et dicotylédones difficiles,
- Un seul herbicide pour désherber toutes vos céréales,
- La possibilité de traiter tôt en sortie d'hiver.

### EcoPack BASF


Une manipulation  
pratique et plus sûre



## UN SEUL HERBICIDE POUR TRAITER GAILLETS ET DICOTYLÉDONES DIFFICILES

### Canopia®, la nouvelle référence anti-gaillet

Canopia® présente d'excellentes performances sur gaillets aussi bien en termes d'efficacité que de régularité.



### Canopia®, plus qu'un anti-gaillet

Grâce à l'association du tritosulfuron et du florasulam, Canopia® apporte un haut niveau d'efficacité sur gaillets mais également sur dicotylédones telles que matricaires, coquelicots, crucifères, stellaire, séneçon, lamiers, capselles, myosotis et véroniques feuille de lierre.

#### → Florasulam

- Famille des triazolopyrimidines
- Groupe HRAC B
- Inhibiteur de l'ALS
- Systémie ascendante importante
- Activité foliaire et racinaire
- Ses points forts : gaillet, coquelicot...**



#### → Tritosulfuron

- Famille des sulfonylurées
- Groupe HRAC B
- Inhibition de la synthèse d'acides aminés
- Système
- Activité foliaire
- Ses points forts : gaillet, véroniques, matricaire...**

Adventices	Florasulam (3,75 g/ha)	Tritosulfuron (50 g/ha)	CANOPIA (0,07 kg/ha)
Matricaire			
Sanve			
Séneçon			
Stellaire			
Capselle BP			
Gaillet			
Myosotis			
Coquelicot			
Alchémille des ch.			
Bleuet			
Lamiers			
Véronique f lierre			
Véronique perse			
Fumeterre officinal			

Efficacités
100-95%
94-85%
84-70%
69-50%
49-0%

La synergie du tritosulfuron et du florasulam

Le « plus » du tritosulfuron

## UN SEUL HERBICIDE POUR DÉSHERBER TOUTES LES CÉRÉALES

Canopia® est homologué sur toutes les céréales à paille d'hiver et de printemps : blés tendres, blés durs, orges, triticale, avoine et seigle.

## CANOPIA® PERMET DE TRAITER TÔT EN SORTIE D'HIVER



Canopia® est compatible avec les principaux anti-graminées\* foliaires du marché et peut s'utiliser dès 5°C (température moyenne journalière). Il pourra ainsi s'intégrer dans vos stratégies de désherbage précoce de sortie d'hiver.

## RECOMMANDATIONS D'UTILISATION



### Stade de la céréale

### Problématiques

### Recommendations

Gaillets + dicotylédones  
(matricaires, coquelicots\*\*, crucifères, stellaire, séneçon, lamiers, capsules, myosotis et véronique à feuille de lierre)

CANOPIA 0,07 kg/ha

Gaillets + dicotylédones + graminées

CANOPIA 0,06 à 0,07 kg/ha + anti-graminées + huile

Gaillets + dicotylédones + graminées + autres dicots  
(géraniums, pensées, ombellifères)

CANOPIA 0,05 kg/ha + anti-graminées + huile + anti-dicots

- Appliquer sur des adventices jeunes, pour limiter au plus tôt leur nuisibilité,
- Période d'utilisation : sortie d'hiver - printemps,
- Conditions d'emploi : efficace dès 5°C, privilégier les hygrométries supérieures à 75%.