


# NE LAISSEZ PAS TOMBER VOS CEREALES !



**POUR FAIRE FACE A  
TOUTES LES SITUATIONS**

- Puissance reconnue
- souplesse d'emploi
- Polyvalence cultures



Températures minimales requises		
Jour du traitement		Dans les 3 jours suivants T° moyenne requise
Mini enregistré > à	Température requise >	
+ 2°C	+ 8°C	+ 8°C

Appliquer sur des céréales en bonne santé, éviter les situations de fortes amplitudes thermiques accompagnées de gelées nocturnes. Eviter de traiter au-dessus de 25°C.

Du 1 janvier 2009 au 30 avril 2009

**1 paire de gant de protection offerte**



Qu'est-ce que Médax® Top ?

- Autorisation de vente n° 2010030
- Composition : 50 g/l de prohexadione-Calcium + 300 g/l Mépiquat-chlorure
- Formulation : SC
- Usages et doses: limitation de la croissance des organes aériens : avoine d'hiver, avoine de printemps, blé dur d'hiver, blé tendre d'hiver, orge de printemps, seigle, triticale : (1l/ha)
- Orge d'hiver : 1,5 l/ha



pour l'achat d'un bidon de 5 L de MEDAX TOP

- Classement toxicologique : Xn- Nocif, R22 – Nocif en cas d'ingestion.
- Délai d'emploi avant récolte – DAR sur céréales: 56 jours
- Distance par rapport au point d'eau – ZNT : 5 mètres (cf arrêté du 21/9/06)
- Délai de rentrée : 6 heures (cf arrêté du 21/9/2006)

Retrouvez l'ensemble de nos informations produits sur : [www.bASF-agro.fr](http://www.bASF-agro.fr)

N°Azur 0 810 02 30 33  
PRIX APPEL LOCAL