

Cultivons l'innovation autrement




Avec **Picotop[®]**,
passer à demain vous donne
une belle longueur d'avance

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

UN DÉSHERBAGE
ANTI-DICOTS

**VRAIMENT
PUISSANT**



Un spectre très large
incluant les dicots
« classiques » :
pensées, véroniques...


...et les dicots
« difficiles » :
coquelicot, crucifères,
gaillet et fumeterre...



SOUPLESSE D'UTILISATION
POUR UNE

**RÉELLE
LIBERTÉ
D'ACTION**

DOCUMENT EN COURS DE FINALISATION
NE PAS DIFFUSER



Le partenaire
de tous les
antigraminées
foliaires pour
un désherbage complet
graminées et dicots.

Efficace même à basse
température (dès 5°)
permettant de traiter tôt
en sortie d'hiver.

DEUX MODES D'ACTION ORIGINAUX,
SANS INHIBITEURS DE L'ALS*, POUR

**DEVANÇER
LES RÉSISTANCES**



PICOLINAFEN F1

Pour éliminer
pensée,
véroniques,
crucifères,
gaillet...



DICHLORPROP-P

Pour éliminer
coquelicot,
crucifères,
gaillet...

* Inhibiteur de l'ALS : mode d'action de type **B** sulfonylurée par exemple.

Avec Picotop[®], passer à demain vous donne une belle longueur d'avance

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION

- 1 ► Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
- 2 ► Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.
- 3 ► Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
- 4 ► Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
- 5 ► Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
- 6 ► Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve, ou utiliser l'incorporateur.

PENDANT L'APPLICATION



7 ►

Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau.
Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

APRÈS L'APPLICATION



8 ►

Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.



9 ►

Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains.
Prendre une douche.



10 ►

Recycler les emballages dans le cadre des collectes **ADIVALOR**.
Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande Osmofilm[®].
© Marque déposée Sté PANTEK France

Contacts utiles

Informations techniques Étiquettes et FDS	BASF Agro	0 810 02 30 33 ou www.agro.basf.fr
Une question de santé	MSA	0 800 887 887
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	0 810 12 18 85 ou www.adivalor.fr

Picotop[®] : marque déposée BASF. Autorisation de vente n° 2120066.
Composition : 20 g/l de picolinafen + 600 g/l de dichlorprop-p.
Classement toxicologique : H302 - H314 - H400 - H410.
Usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi :
consulter **www.agro.basf.fr** - BASF Agro SAS - 21, Chemin de la Sauvegarde
69134 Ecully Cedex. Novembre 2014