

Fongicides céréales - Pack 5 L + 5 L

Priaxor® EC à base de Xemium* + Relmer® Pro

Une performance de haut niveau sur blés et orges pour simplifier la gestion des stocks fongicide

BASF
We create chemistry



BÉNÉFICES

- Performance de haut niveau sur blés et orges ; limite les stocks de fongicides et optimise la trésorerie des exploitations,
- Sérénité vis-à-vis des conditions climatiques au moment des applications grâce à la performance Stick & Stay et à la curativité Xemium*,
- Simplicité d'utilisation grâce à un dosage facile à mettre en œuvre et à des emballages Ecopack,
- Performance durable avec 3 modes d'action complémentaires.

PERFORMANCE DE HAUT NIVEAU SUR BLÉS ET ORGES :

■ BLÉS



Témoin
Rendement
81,6 q/ha



Priaxor® EC 0,65 + Relmer® Pro 0,65
Rendement 102,9 q/ha
+ 21,3 q/ha

■ ORGES



Témoin
Rendement
69,2 q/ha



Priaxor® EC 0,65 + Relmer® Pro 0,65
Rendement 91,8 q/ha
+ 22,6 q/ha

Priaxor® EC + Relmer® Pro une offre SDHI très performante sur septoriose et rouilles.
Synthèse essais blé tendre 2017 n=6

Grâce à l'action de la pyraclostrobine,
Priaxor® EC + Relmer® Pro est particulièrement adapté aux situations d'helminthosporiose résistante aux SDHI.
Synthèse essais orges 2017 n=8

SÉRÉNITÉ VIS-À-VIS DES CONDITIONS CLIMATIQUES AU MOMENT DES APPLICATIONS :

PERFORMANCE
STICK & STAY
PRIAXOR® EC



Séchage
6 fois plus rapide qu'une formulation classique



Adhésion & rétention sur les feuilles accrues



Pénétration & transport rapides dans le végétal

+30%
de bouillie fongicide retenue sur F1 & F2

Curativité accrue :
+10%
de pénétration Xemium*

SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE :

1 dose Priaxor® EC pour 1 dose Relmer® Pro



Bidon Ecopack
5L Priaxor® EC



Bidon Ecopack
5L Relmer® Pro


Dosage simple : Quelle que soit la dose/ha, même équilibre Priaxor® EC et Relmer® Pro

PERFORMANCE DURABLE GRÂCE À L'ASSOCIATION DE 3 MODES D'ACTION COMPLÉMENTAIRES :




RECOMMANDATIONS DOSES ET STADES D'APPLICATION :

■ BLÉS



■ ORGES



Adapter la dose au contexte de la parcelle (pression parasitaire, sensibilité variétale, type de programmes...)

Priaxor® EC de 0,65 à 1 L/ha + Relmer® Pro de 0,65 à 1 L/ha

RECOMMANDATIONS MISE EN OEUVRE :

Ne pas laisser reposer la bouillie, elle doit être appliquée de suite. Si plusieurs pulvérisateurs doivent être préparées successivement avec Priaxor® EC + Relmer® Pro, il est recommandé d'effectuer un rinçage de l'appareil toutes les 2 cuves et dans tous les cas en fin de journée.

QU'EST-CE QUE PRIAXOR® EC + RELMER® PRO ?

	Priaxor® EC	Relmer® Pro
AMM	N° 2161101	N° 2010280
Composition	75 g/L fluxapyroxad* + 150 g/L pyraclostrobin	90 g/L metconazole
Formulation	EC (Concentré Émulsionnable)	EC (Concentré Émulsionnable)
Cultures et usages autorisés	Blés, triticale épautre : septoriose ¹ , rouilles brune et jaune, oïdium ¹ Orges : helminthosporiose, rhynchosporiose, ramulariose, rouille naine, oïdium ¹ Avoine : rouille couronnée, oïdium ¹ Seigle : rhynchosporiose, rouilles, oïdium ¹	Blés, triticale épautre : septoriose, oïdium, rouilles, fusariose Orges : rhynchosporiose, rouilles, oïdium Avoine : rouille couronnée Seigle : rhynchosporiose, rouilles
Dose autorisée	1,5 L/ha	1 L/ha
Classement	 Mention d'avertissement : Attention H332, H302, H351, H400, H410	 Mention d'avertissement : Attention H319 - H373 - H361d - H411
ZNT Aquatique	5 mètres	5 mètres
ZNT Arthropodes		5 mètres
Nombre maximum d'applications	1 par an	1 par an
DAR	35 jours	35 jours
DRE	48 H	48 H

Ce pack est utilisable pour lutter contre les maladies sur lesquelles les 2 produits sont autorisés (usages communs), ou pour lutter contre un complexe maladies où l'un et/ou l'autre sont homologués sur des pathogènes distincts (usages différents).

¹ Uniquement pour une lutte conjointe contre différents agents pathogènes

Pour toutes informations techniques,
nos experts sont à votre écoute

0 800 100 299 Service & appel gratuits

Protection utilisateur lors de la manipulation :
Gants en nitrile EN374, EPI vestimentaire (combinaison) certifié selon norme NF EN ISO 27065 (niveau C1) , tablier Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

426CFE1018R - Septembre 2018

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.

Usages, doses conditions et restrictions d'emploi: se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.basf.fr.

*Xemium®, nom d'usage de la substance active fluxapyroxad. H351, H400, H410. SDHI : Succinate Déshydrogénase Inhibiteur.

BASF FRANCE SAS – DIVISION AGRO

21 CHEMIN DE LA SAUVEGARDE – 69134 ECULLY CEDEX
Tél : 04 72 32 45 45

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**