

# Signum®

## le fongicide dédié aux fruits et légumes

**BASF**  
The Chemical Company



Cultures	Ravageurs	Doses	DAR	Nbre max d'applications
abricotier	Oïdium	0,6 kg/ha	3 j	3
cerisier	Moniliose sur fruits	0,75 kg/ha	3 j	2
Pêcher	Moniliose sur fruits	0,75 kg/ha	3 j	2
	Oïdium	0,6 kg/ha		3
Prunier	Rouille du prunier	0,45 kg/ha	3 j	2
	Moniliose sur fruits	0,75 kg/ha		2
Framboisier et autres rubus	Botrytis	1,5 kg/ha	3 j	1
	Didymelia	1 kg/ha		2
	Septoriose	1 kg/ha		2
	Anthracnose	1 kg/ha		2
	Oïdium	0,75 kg/ha		2
	Rouille	0,45 kg/ha		2
Framboisier	Dessèchement des cannes	1 kg/ha	3 j	2
Cassissier	Botrytis	1,5 kg/ha	3 j	1
	Anthracnose	1 kg/ha		2
	Septoriose	1 kg/ha		2
	Oïdium	0,75 kg/ha		2
	rouille	0,45 kg/ha		2
Fraisier	Oïdium	0,6 kg/ha	3 j	2
	Pourriture grise	1,8 kg/ha		1
	Anthracnose	1,8 kg/ha		1

Cultures	Ravageurs	Doses	DAR	Nbre max d'applications
Aubergine	Pourriture grise	0,6 kg/ha	14 j	3
	Alternaria	0,4 kg/ha		2
	Oïdium	0,4 kg/ha		2
	Sclerotinia	1 kg/ha		2
Carotte	Alternaria	1 kg/ha	14 j	2
	Mycosphaerella	1 kg/ha		2
Choux (uniquement sur choux à inflorescences et choux pommés)	Pourriture du collet	1,5 kg/ha	14 j	2
	Rhizoctonia solani	1,5 kg/ha		2
Laitue	Botrytis	1,5 kg/ha	14 j	2
	Rhizoctonia solani	1,5 kg/ha		2
Mâche	Botrytis	1,5 kg/ha	14 j	2 applic. Max/an et 1 max/cycle cultural
	Rhizoctone	1,5 kg/ha		
	Phoma	0,67 kg/ha		
Oignon	Botrytis squamosa	1,5 kg/ha	14 j	2
Poivron	Oïdium	0,5 kg/ha	3 j	2
Poireau	Pourriture grise	0,6 kg/ha	3 j	2
	Alternaria porri	0,6 kg/ha		3
Echalote	mildiou	1 kg/ha	14 j	3
Pissenlit	Botrytis squamosa	1,5 kg/ha	14 j	2
Scorsonère-salsifis	Rhizoctone	1,5 kg/ha	14 j	2
	Oïdium	0,4 kg/ha		2
Scorsonère	Rouille blanche	0,4 kg/ha		2
	Alternariose	0,4 kg/ha	14 j	2
Tomate	Oïdium	0,5 kg/ha	3 j	3
	Pourriture grise	0,6 kg/ha		3

### CULTURES PORTE-GRAINES MINEURES

Cultures	Ravageurs	Doses	DAR	Nbre max d'applications
Potagères, PPAMC et florales porte-graine	Maladie des tâches foliaires (alternaria)	0,4 kg/ha	14 j	3
	Oïdium	0,4 kg/ha		2
	Maladies à sclérotes (botrytis, sclerotinia, sclerotium)	1 kg/ha		3
	Phoma	1 kg/ha		3
	Stemphylliose	1 kg/ha		2
	Anthracnose	1 kg/ha		2
Rouilles		1 kg/ha		2
Ombellifères porte-graines	septoriose	1 kg/ha		2

### NOMBRE MAXIMUM D'APPLICATIONS PAR AN TOUS USAGES CONFONDUS :

- Carottes, choux : 2 par an.
- Framboisiers et cassissiers : 3 ou 4 traitements par saison sur différentes maladies sans excéder 3 kg/ha/an. Avec une seule application sur Botrytis.
- Scorsonière : 3 applications maximum par an.
- Abricotier, prunier, pêcher : 3 applications maximum par an, cerisier : 2
- Fraisier : 3 applications maximum par an, ne pas dépasser 3,6 kg/ha/an.
- Laitue : 2 applications maximum par an.
- Tomate, poireau : 3 applications maximum par saison.
- Poivron : 2 applications maximum par saison.
- Zone non traitée par rapport aux points d'eau (ZNT) :
  - cultures légumières : 5 m.
  - Framboisier, cassissier : 20 m. Arbres fruitiers : 50 m.
- Délai de rentrée : 6 heures ; 8 heures sous abri.

Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Septembre 2010.