

Anti-oïdium vigne

Vivando®

Faites le choix de la facilité




- **FACILE à positionner** dans un programme
- **FACILE à intégrer** dans les chantiers de traitement

FACILE À POSITIONNER DANS UN PROGRAMME CONTRE L'OÏDIUM

■ MODE D'ACTION COMPLET

Vivando provoque la rupture des filaments de mycélium : **pour une action complète même après contamination.**



Croissance mycélienne

Vivando peut contrôler l'oïdium même sur épidémie initiée (sur des symptômes non encore visibles).
Il contribue à limiter les dégâts.

■ EFFICACITÉ CURATIVE




EFFICACITÉ

Vinipole Sud Bourgogne, organisme BPE

Encore
87%
d'efficacité,
même **3 jours**
après
contamination.

■ EFFICACITÉ PREVENTIVE

Une protection efficace et régulière des feuilles et des grappes **pendant 14 jours.**



EFFICACITÉ

Synthèse de 34 essais BASF

97,5%
d'efficacité,
avant
contamination.

**POUR OPTIMISER VOTRE PROGRAMME,
PRÉFÉRER UN POSITIONNEMENT PRÉVENTIF.**

FACILE À INTÉGRER DANS LES CHANTIERS DE TRAITEMENT



- Compatibilité éprouvée*
- Simplicité de mélange avec tous les anti-mildious*
- **Pionnier de la famille des benzophenones, c'est un outil d'alternance** reconnu dans les programmes oïdium comme black-rot grâce à sa souplesse de positionnement
- **Nombreuses tolérances d'importation** dans les principales destinations d'export des vins et alcools français

*Pour la majorité des spécialités du marché, se reporter à la réglementation mélange en vigueur et demander conseil à votre conseiller.

PRÉCONISATIONS D'EMPLOI

VIVANDO® S'UTILISE DURANT TOUTE LA PÉRIODE DE SENSIBILITÉ À L'OÏDIUM



Période homologuée

Vivando® 0,2 l/ha

DAR : 28 jours


Période idéale

Tôt & Fort

Vivando est un anti-oïdium performant.

- Homologué à la dose de 0,2 l/ha
- Utilisable pendant toute la période de sensibilité à l'oïdium
- A utiliser en préventif, à la cadence de 14 jours
- 2 applications maximum par saison (en incluant les autres produits à mode d'action similaire (aryle phényle cétones))
- Ne pas utiliser en dernier traitement

FICHE D'IDENTITÉ

Marque déposée BASF	Vivando®
AMM	N° 2060050
Composition	500 g/l de métrafénone
Formulation	SC
Classements	H 411 : toxique pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets néfastes à long terme 
Usage et dose autorisés en vigne	Oïdium de la vigne à 0,2 l/ha
Conditionnements	1 l et 5 l
Nombre d'applications	2 maximum par an en incluant tous les Aryle phényle cétones
Délai d'emploi avant récolte	28 jours
Distance aux points d'eau	5 m
Délai de rentrée	6 h
Protection de l'utilisateur lors de la préparation de la bouillie	Gants en nitrile EN374, EPI vestimentaire certifié selon norme NF EN ISO 27065 (niveau C1), tablier Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

Pour toutes informations techniques, nos experts sont à votre écoute

 **N°Azur 0 810 02 30 33**
PRIX APPEL LOCAL

Protection utilisateur lors de la préparation de la bouillie : gants en nitrile EN374, bottes, combinaison de travail polyester/coton (65%/35%) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

407VIFE0918R - Septembre 2018

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.

Usages, doses conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.basf.fr et/ou www.phytodata.com

BASF France SAS – Division Agro – 21 chemin de la Sauvegarde – 69134 ECULLY Cedex - 04 72 32 45 45 – www.agro.basf.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.