

- 2007, 2008 et 2009 = 3 contextes maladies différents mais 3 campagnes de confirmation des performances : efficacité, persistance et bénéfice rendement.

 Bell®	<i>Boscalid</i>	Des bénéfices rendement grâce à son efficacité maladies (notamment septoriose, piétin-verse)	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Epoxiconazole</i>	Toujours la référence sur feuille (septoriose et rouilles)	<input checked="" type="checkbox"/>
PYROS®	<i>Prochloraze</i>	Complément septoriose : gestion des souches Apport complémentaire sur piétin-verse	<input checked="" type="checkbox"/>

Performances encore validées


BELL®+PYROS® se caractérise par sa polyvalence, une excellente efficacité préventive, une longue durée de protection pour un bénéfice rendement par rapport aux références.

- **BELL®+PYROS® la base de votre programme fungicide céréales**

Régionalement, la septoriose et le piétin verse sont toujours préjudiciables pour le rendement. Des pertes allant jusqu'à 15 q/ha ont été observées en l'absence d'un premier traitement fungicide au 1er nœud. Dans ce contexte, BELL®+PYROS® confirme sa valeur.


Piétin verse & rendement

2008 - N=6 essais - en programme



Septoriose & rendement

2008 - N=6 essais - en programme




◆ Bell® est efficace sur toutes souches de piétin verse et sans résistances croisées avec les autres familles chimiques. Bell®+Pyros® permet ainsi un contrôle efficace du piétin verse.

◆ Bell®+Pyros® associe des matières actives de référence et de modes d'action différents permettant une efficacité optimum contre la septoriose.

Optimisez votre programme fongicides : choisissez le bon positionnement et la bonne dose

■ Positionnement de BELL® PYROS®

Sur blé, **Bell® PYROS®** s'utilise au stade **1 nœud** pour lutter contre **Piétin verse et 1–2 nœuds** pour lutter contre **Septoriose & Rouilles**.



Bell®
Nouveau DAR =
35 jours

Sur orge : de la montaison au stade "sortie des barbes".



■ Dose

Ha par bidon	3 Ha	3,5 Ha
DOSES BELL & PYROS	1L + 0,6L	0,9L + 0,5L
boscalid	233 g/ha	200 g/ha
époxiconazole	67 g/ha	57 g/ha
prochloraze	270 g/ha	231 g/ha

Bell®

Autorisation de vente N° : 2060120
Composition : 233 g/l boscalid + 67 g/l époxiconazole
Formulation : suspension concentrée SC
Usages autorisés :
 BLES : septoriose, rouille brune, rouille jaune, piétin verse
 ORGES : helminthosporiose, rhynchosporiose, rouille naine, oïdium, piétin verse
 AVOINE : rouille couronnée, oïdium, piétin verse
 SEIGLE : rhynchosporiose, rouille brune
 TRITICALE : septoriose, rouille brune, rouille jaune, oïdium, piétin verse
Dose autorisée : 1,5 l/ha
Classement toxicologique :
 - N : Dangereux pour l'environnement
 - Xn : Nocif
 - R40 : Effet cancérogène suspecté, preuves insuffisantes
 - R41 : Risque de lésions oculaires graves
 - R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
 - R 62 : Risque possible d'altération de la fertilité
 - R63 : Risque possible pendant la grossesse et effets néfastes pour l'enfant
Distance aux points d'eau : respecter une zone non traitée (ZNT) de 5m
Délai d'emploi avant récolte : 35 jours
Délai de rentrée dans la parcelle: 24 heures (Cf Arrêté J.O du 21/09/06)
Nombre maximum d'applications par an : 2
 Ports de gants et vêtements de protection et d'un appareil de protection oculaire pendant toutes les opérations de traitement

Pyros®

Autorisation de vente N° : 9400494
Composition : 450 g/l prochloraze
Formulation : concentré émulsionnable EC
Usage et dose autorisées :
 BLES : piétin verse 1,33 L/ha
 oïdium, spétoriose, fusariose des épis : 1L/ha
 ORGES : helminthosporiose, rhynchosporiose, oïdium : 1L/ha

Classement toxicologique:
 - Xn : Nocif
 - N : Dangereux pour l'environnement
 - R22 : Nocif en cas d'ingestion
 - R41 : Risque de lésions oculaires graves
 - R65 : Nocif : Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
 - R 66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
 - R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
 - R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Distance aux points d'eau : respecter une zone non traitée (ZNT) de 5m
Délai d'emploi avant récolte : 42 jours
Délai de rentrée dans la parcelle: 24 heures (Cf Arrêté J.O du 21/09/06)