

# PRESERVER LE POTENTIEL DE VOS CEREALES



**N'attendez pas pour protéger vos céréales et évitez  
des pertes de rendements**



Attaques de piétin verse, septoriose et rouille brune,  
en 2007, année à forte pression maladies

## Les constats de la campagne 2006-2007

- Efficacité rime avec préventivité : une intervention en préventif c'est une meilleur efficacité
- Efficacité rime avec « bonne dose » : appliquer la dose homologuée, c'est optimiser l'efficacité

## Nos préconisations pour le T1

- Intervenir précocement, dès le stade 1-2 nœud, privilégier le stade et non la date d'application
- Augmenter les doses de 20% pour gagner en persistance (dans tous les cas ne jamais dépasser la dose autorisée).

## BELL® une nouvelle famille chimique - un spectre large

BELL®

Blés			Orges		
Piétin-Verse	Septoriose	Rouilles	Helmintho- sporiose	Rhynco- sporiose	Rouilles
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**Bell®** 1,5 à 1,2 L

### Qu'est-ce que BELL® ?

- Autorisation de vente n° 2060120
- Composition : 233 g/l boscalid + 67 g/l époxiconazole
- Formulation : suspension concentrée SC
- Usages et doses : BLES : septorioses, rouille brune, rouille jaune, piétin verse  
ORGES : helminthosporiose, rhynchosporiose, rouille naine, oïdium, piétin verse  
AVOINE : rouille couronnée, oïdium, piétin verse  
SEIGLE : rhynchosporiose, rouille brune  
TRITICALE : septorioses, rouille brune, rouille jaune, oïdium, piétin verse  
Dose autorisée : 1,5 l/ha
- Classement toxicologique : Xn : Nocif - N : Dangereux pour l'environnement -  
R40 : Effet cancérogène suspecté ; preuves insuffisantes -

- R41 : Risque de lésions oculaires graves - R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique - R62 : Risque possible d'altération de la fertilité - R63 : Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
- Délai d'emploi avant récolte - DAR sur céréales : 56 jours
- Distance par rapport au point d'eau - ZNT : 5 mètres
- Délai de rentrée dans la parcelle : 24 heures
- Nombre maximum de traitement : 2 par saison
- Port de gants et de vêtements de protection et d'un appareil de protection oculaire pendant toutes les opérations de traitement.

Retrouvez l'ensemble de nos informations produits sur : [www.basf-agro.fr](http://www.basf-agro.fr)

N°Azur 0 810 02 30 33  
PRIX APPEL LOCAL

