

Nouveau délai avant récolte:


Avec son **nouveau délai avant récolte de 35 jours**, l'innovation Bell® est maintenant aussi disponible pour le T2 des orges et des blés :

- **Des performances rendement maximisées.**
- **Une meilleure valorisation du boscalid** sur l'ensemble du complexe parasitaire.


Efficacité :

Une curativité septoriose et une efficacité rouille brune de haut niveau

Septoriose




Rouille brune



Une des meilleures solutions sur orges

**Homologué
BLES
ORGES
TRITICALE
SEIGLE
AVOINE**




Bell®

L'innovation fongicide céréales pour un gain net maximisé

Persistance :

Bell®, grâce au boscalid, apporte la persistance et des bénéfices rendements



N = 10 essais - Simple Application Stade: 3 nœuds - Sortie dernière feuille

Bell® offre une bonne maîtrise de *Septoria tritici* par association de :

- boscalid qui allie efficacité et protection de longue durée,
- époxiconazole qui apporte une activité préventive et curative.

Par l'effet Boscalid et pour une même dose d'époxiconazole, le gain de rendement observé en essais est de 4 q/ha en moyenne.

Bell® la performance d'une famille chimique innovante

Mode d'action unique du boscalid : prévention résistances

Très longue durée de protection

Bénéfices rendement au delà des bénéfices fongicides

Confirmé en 2010

Comment s'utilise-t-il ?

BELL® 1,2 à 1,5 l/ha

La dose sera adaptée selon la pression maladie et le type de programme envisagé

Sur blé, Bell® s'utilise :

Sur orge: 1 à 2 fois, de la montaison au stade "sortie des barbes".

Sur avoine, seigle et triticales: dès les 1ers symptômes, de la montaison à la fin gonflement

Qu'est-ce que Bell® ?

Bell® marque déposée BASF

Autorisation de vente N° : 2060120

Composition : 233 g/l boscalid + 67 g/l époxiconazole - Formulation : suspension concentrée (SC)


Usages : BLES : septorioses, rouille brune, rouille jaune, piétin verse - ORGES : helminthosporiose, rhynchosporiose, rouille naine, oidium, piétin verse - AVOINE : rouille couronnée, oidium, piétin verse - SEIGLE : rhynchosporiose, rouille brune - TRITICALE : septorioses, rouille brune, rouille jaune, oidium, piétin verse - Dose autorisée : 1,5 l/ha - Classement : N - Xn - R40 : Effet cancérigène suspecté, preuves insuffisantes - R41 : Risque de lésions oculaires graves / R51/53 : toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique / R62 : Risque possible d'altération de la fertilité / R63 : Risque possible pendant la grossesse et effets néfastes pour l'enfant - Zone de non traitement : respecter une zone non traitée de 5 mètres - Délai d'emploi avant récolte : 35 jours - Délai de rentrée : 24 heures après traitement - Nombre maximum de traitement : 2 par saison

Protection utilisateur lors de la préparation : gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetables de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.

Opus® : Marque déposée BASF - Autorisation de vente 2000032 - Composition : 125 g/l Epoxiconazole - Formulation SC - Dose autorisée sur Céréales : 1 l/ha - Usages autorisés : Avoine : Rouille couronnée, oidium - Blé : Rouille brune, jaune, septoriose, oidium, fusariose des épis - Orge : Helminthosporiose, rouille naine, rouille jaune, rhynchosporiose, oidium - Seigle : Rhynchosporiose, rouille brune - Triticale : Rouille brune, septoriose - Classement : N - Xn - R36/38 - R40 - R62 - R63 - R50/53 - Zone de non traitement : 5 mètres - Délai d'emploi avant récolte sur céréales : 35 jours - Délai de rentrée : 6 heures après traitement. Comet® : Marque déposée BASF - Autorisation de vente 2000032 - Composition : 250 g/l Pyraclostrobin - Dose autorisée sur Céréales : 1 l/ha usages autorisés : Blé : Rouille Brune, Rouille Jaune, Fusa sur épi (M. nivale) - Orge : Helminth (P. teres), Rhyncho, R. Naine - Avoine : Rouille couronnée - Seigle : Rouille brune, rhyncho - Triticale : Rouille Brune, Rouille Jaune - Utilisable uniquement en mélange - Classement : N - Xn - R20/22 - R38 - R50/53 - Zone de non traitement : 20 mètres - Délai d'emploi avant récolte : 35 jours - Délai de rentrée : 24 heures après traitement - Nombre maximum d'application : 2

Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 ou www.basf-agro.fr
Une question de santé	MSA	Phyt'attitude N° Vert 0 800 887 887 APRÈS 14H00 DÉPOSÉ UN POSTE PRIÉ
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0810 12 18 85 ou www.adivalor.fr



10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION	
1	Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
2	Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi.
3	Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
4	Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
5	Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
6	Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor.
PENDANT L'APPLICATION	
7	Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.
APRÈS L'APPLICATION	
8	Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
9	Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
10	Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires. BASF Agro recommande le procédé Osmofilm®