


## Caramba® Star


L'étalon  
régulateur  
qui optimise  
les récoltes.



# Réussissez la reprise de végétation avec Caramba® Star

**Contrôle de la verse,  
c'est le moment.**

RETENEZ LE STADE DE TRAITEMENT OPTIMAL :



Caramba® Star est souple d'emploi, son emploi possible entre les stades C2 et D2 permet d'attendre d'avoir des conditions optimales pour traiter : temps poussant et absence de gelée ou de rosée.

La réglette d'aide à la décision, régulateur Caramba® Star, réalisée en collaboration avec le Cetiom permet de raisonner l'application d'un régulateur selon 3 critères :

- la sensibilité variétale à la verse
- le peuplement si :
  - > à 15 pieds/m linéaire (seoir de précision)
  - > 50 plantes/m<sup>2</sup> (seoir à céréales)
- et/ou la disponibilité en azote si elle est > besoins.

Demandez-la à votre interlocuteur BASF.

**Cylindrosporiose, Phoma  
c'est le moment**

- Caramba® Star appliqué à la reprise de végétation est très efficace sur cylindrosporiose et présente une efficacité complémentaire sur les attaques tardives de phoma.

**Caramba® Star, c'est le moment**

- **Dose recommandée** : 0,8 L/ha, risque fort de verse et/ou de maladies comme cylindrosporiose, attaques tardives de phoma, oïdium.  
0,6 L/ha risque de verse faible à moyen et/ou de maladies comme cylindrosporiose, attaques tardives de phoma, oïdium.
- Caramba® Star s'utilise sans adjuvant.
- Appliquer sur des colzas en bon état végétatif.
- **DAR** : 45 jours

**BASF**

The Chemical Company

# Description du produit

**Marque déposée BASF :** Caramba® Star

**Autorisation de vente n° :** 2010280

**Composition :** Metconazole 90 g/l.

**Formulation :** Concentré soluble.

**Classement toxicologique :** - Xi Irritant

- R63 : risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant
- Aqua : dangereux pour les organismes aquatiques.

**Usages et doses autorisées :**

- crucifères oléagineuses : régulateur de croissance à 0,8 L/ha
- phoma à 0,6 L/ha
- cylindrosporiose, oïdium, alternariose, sclerotinia à 0,8 L/ha.

**Délai avant récolte :** 45 jours sur colza

**Délai de rentrée :** 6 h (cf. Arrêté J.O. du 12/09/2006)

**Distance aux points d'eau :** respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 mètres (cf. Arrêté du 12/09/2006)



## 10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

### AVANT L'APPLICATION



1 ►

Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.



2 ►

Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi.



3 ►

Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).



4 ►

Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.



5 ►

Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).



6 ►

Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor.



### PENDANT L'APPLICATION



7 ►

Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.



### APRÈS L'APPLICATION



8 ►

Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.



9 ►

Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.



10 ►

Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande le procédé Osmofilm®

© Marque déposée Sté PANTEK France



### Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	<b>N°Azur 0 810 02 30 33</b> PRIX APPEL LOCAL ou <a href="http://www.bASF-agro.fr">www.bASF-agro.fr</a>
Une question de santé	MSA	<b>Phyt'attitude</b> <b>N° Vert 0 800 887 887</b> APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 <b>01 49 64 57 33</b>
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	<b>N°Azur 0 810 12 18 85</b> PRIX APPEL LOCAL ou <a href="http://www.adivalor.fr">www.adivalor.fr</a>