


CARYX®

A LA REPRISE
DE VEGETATION

flash news

En 2012, vigilance accrue face aux risques de verse.

Gros colza, forte densité, élongation précoce, en 2012, les risques de verse sont élevés. En février, il s'agit de bien observer ses parcelles et se préparer à intervenir dès le début de la montaison.



Caryx® : Canaliser l'énergie de la plante vers le rendement.


Éviter la verse et ses conséquences



Optimiser l'architecture de la plante



Contrôler la cylindrosporiose



Règle de décision printemps

Raisonnez l'application de Caryx selon les critères suivants :


- sensibilité variétale à la verse
- peuplement si :
 - > à 15 pieds/m linéaire (seoir de précision)
 - > 50 plantes /m² (seoir à céréales)
- disponibilité en azote si elle est supérieure aux besoins.

Intervenir lorsqu'au moins deux d'entre eux sont réunis.
A noter que l'élongation précoce à l'automne accentue le risque de verse au printemps.

Reprise de végétation

Risque moyen à fort : 0,7 à 1L/ha

Risque fort à très fort : 1 à 1,2 L/ha



- > Caryx est prêt à l'emploi et s'utilise sans adjuvant.
- > Caryx s'applique sur une plante en bon état végétatif.
- > Respecter la dose maximale de 1,4 L/ha et par campagne (en une application ou en fractionnement, ex. : 0,7 L/ha à l'automne puis 0,7 L/ha au printemps).

© Marque déposée BASF. Autorisation de vente n°2090068. Metconazole 30 g/l + mépiquat chlorure 210 g/l. Concentré soluble. Classement toxicologique : Xn : nocif - N : dangereux pour l'environnement - R20/22 : Nocif par inhalation et ingestion - R41 : Risque de lésions oculaires graves - R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Usages autorisés sur Colza : régulateur de croissance, cylindrosporiose. Dose autorisée sur Colza : 1,4 L/ha par campagne (en une application ou en fractionnement, automne puis printemps). S'utilise sans adjuvant. Délai avant récolte : 80 jours. Zone non traitée : 5 mètres. Délai de rentrée : 24 heures. Janvier 2012 - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF Agro qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Dangereux - Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. 472COLRGED0112R

BASF
The Chemical Company

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOMÉDICAUX AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.