

# Herbicides Colza **TANARIS® + LOGIX®**, Efficacité et souplesse au service du désherbage des colzas


**BASF**  
We create chemistry



## BENEFICES

- Efficacité sur un grand nombre d'adventices
- Souplesse d'utilisation en post-semis pré-levée ou post-levée précoce pour s'adapter à toutes les conditions

## EFFICACITE et SOUPLESSE au service du désherbage



## Champ d'action de TANARIS® 1 L/ha + LOGIX® 1 L/ha

Efficacité en %	Dicotylédones			Graminées
	Classiques	Diverses	Ombellifères	
Très sensible [95—100]	Alchémille des champs Matricaire sp. Myosotis Stellaire Véronique de Perse	Arroche hastée		Pâturin annuel
Sensible [85—95]	Capselle bourse-à-pasteur Coquelicot Gaillet gratteron Laiteron sp. Véronique à f. de lierre	Morelle Sénéçon commun	Carotte sauvage Ethuse	
Moyennement sensible [70—85]	Fumeterre officinale	Géraniums	Ammi majus	Ray-grass Vulpin des champs
Peu sensible [50—70]				
Non sensible [0—50]		Ravenelle		Reposse de céréales

# SOUPLESSE DE STADE D'APPLICATION



Tanaris® + Logix®

OU

Tanaris® + Logix®



**Post-semis prélevée ou post-levée précoce, le pack s'adapte à vos conditions !**

Si les conditions le nécessitent (déficit hydrique, fortes précipitations à craindre dans 2-3 jours qui suivent le semis, sols très motteux ou caillouteux, terres filtrantes), le pack Tanaris® + Logix® peut s'appliquer en post-levée précoce (stade rayonnant, 70% des colzas au stade cotylédons)



Dose pivot

1 L/ha

1 L/ha

Dans tous les cas ne pas dépasser la dose maximale de 600 g/ha de dmpta-p, soit une dose maximale de Tanaris® (1,1 L/ha) + Logix® (1,1 L/ha).



## QU'EST CE QUE TANARIS® + LOGIX®

	TANARIS®	LOGIX®
<b>AMM</b>	N° 2170158	N° 2090112
<b>Composition</b>	333 g/L de dmpta-p + 167 g/L de quinmérac	200 g/L de dmpta-p + 200 g/L de métazachlore
<b>Formulation</b>	Suspo-Emulsion (SE)	Concentré Emulsionnable (EC)
<b>Usages et doses autorisés</b>	Colza d'hiver, navette, cameline, moutarde : 1,5 L/ha Entre les stades BBCH 00 et BBCH 18	Colza : 3 L/ha Au plus tard à BBCH 18
<b>Classement</b>	Mention d'avertissement : Attention H317 - H319 - H400 - H410	Mention d'avertissement : Danger H302 - H304 - H317 - H319 - H332 - H351 - H400 - H410
<b>ZNT Aquatique</b>	5 m	5 m
<b>ZNT (plantes non cibles)</b>	5 m	
<b>Nombre maximum d'applications</b>	1 application tous les 2 ans	1 application tous les 2 ans
<b>DAR</b>	DAR F (BBCH 18)	DAR F (BBCH 18)
<b>DRE</b>	48 heures	48 heures
<b>Autres aspects réglementaires</b>	Pour protéger les eaux souterraines, suite à une application sur colza d'hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du diméthénamide-P ou du quinmérac plus d'une année sur deux. Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45%.	Utilisation possible en post-semis/prélevée ou post-levée précoce.  Ne pas dépasser la dose de 1000 g de métazachlore/ha sur une période de 3 ans en 1 ou plusieurs applications.

## CONTACTS UTILES

Pour plus d'informations techniques

BASF  
France  
Division  
Agro

N°Azur 0 810 02 30 33  
ou [www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr)

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou [www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr)

® : marques déposées BASF - 06/2017

Réf CASTOR : 156COHE0617R

Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

**BASF France S.A.S. - Division Agro-**

21 chemin de la Sauvegarde - 69134 ECULLY

Cedex

Tél. 04 72 32 45 45 - [www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr)

**Protection utilisateur lors préparation bouillie :** gants en nitrile EN374, bottes, combinaison de travail polyester/coton (65%/35%) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.**  
**AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**