

Herbicides Colza

TANARIS[®] + NOVALL[®],

**Efficacité et souplesse au service du
désherbage des colzas**



BENEFICES

- Efficacité sur un grand nombre d'adventices
- Souplesse d'utilisation en post-semis pré-levée ou post-levée précoce pour s'adapter à toutes les conditions

EFFICACITE et SOUPLESSE au service du désherbage



Champ d'action de TANARIS[®] 0,65L/ha + NOVALL[®] 1,3L/ha

Efficacité en %	Dicotylédones			Graminées
	Classiques	Diverses	Ombellifères	
Très sensible [95—100]	Alchémille des champs Capselle b.-à-pasteur Laiteron sp. Lamier sp. Matricaire sp. Stellaire Véronique de Perse	Arroche hastée		
Sensible [85—95]	Coquelicot Gaillet gratteron Myosotis Véronique à f. de lierre	Morelle Séneçon commun Shérardie des champs	Ammi majus Carotte sauvage Ethuse	Pâturin annuel
Moyennement sensible [70—85]	Euphorbe réveil-matin Fumeterre officinale	Sisymbre		Ray-grass Vulpin des champs
Peu sensible [50—70]				Vulpie queue de rat
Non sensible [0—50]		Géraniums		Repousse de céréales

SOUPLESSE DE STADE D'APPLICATION



Tanaris® + Novall®

OU

Tanaris® + Novall®



Post-semis pré-levée ou post-levée précoce, le pack s'adapte à vos conditions !

Si les conditions le nécessitent (déficit hydrique, fortes précipitations à craindre dans 2-3 jours qui suivent le semis, sols très motteux ou caillouteux, terres filtrantes), le pack Tanaris® + Novall® peut s'appliquer en post-levée précoce (stade rayonnant, 70% des colzas au stade cotylédons)



TANARIS
1 x 5L

NOVALL
2 x 5L



Dose pivot






0,65 L/ha

1,3 L/ha

Dans tous les cas ne pas dépasser la dose maximale de 250 g/ha de quinmérac, soit une dose maximale de Tanaris® (0,65 L/ha) + Novall® (1,3 L/ha).

QU'EST CE QUE TANARIS® + NOVALL®



	TANARIS®	NOVALL®
AMM	N° 2170158	N° 9000833
Composition	333 g/L de dmta-p + 167 g/L de quinmérac	400 g/L de métazachlore + 100 g/L de quinmérac
Formulation	Suspo-Emulsion (SE)	Suspension Concentrée (SC)
Usages et doses autorisés	Colza d'hiver, navette, cameline, moutarde : 1,5 L/ha Entre les stades BBCH 00 et BBCH 18	Colza—moutarde : 2,5 L/ha—autres usages : consulter l'étiquette
Classement	Mention d'avertissement : Attention   H317 - H319 - H400 - H410	Mention d'avertissement : Attention    H317- H351- H400- H410
ZNT Aquatique	5 m	20 m
ZNT (plantes non cibles)	5 m	
Nombre maximum d'applications	1 application tous les 2 ans	1 application tous les 2 ans
DAR	DAR F (BBCH 18)	
DRE	48 heures	48 heures
Autres aspects réglementaires	Pour protéger les eaux souterraines, suite à une application sur colza d'hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du diméthénamide-P ou du quinmérac plus d'une année sur deux. Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45%.	Ne pas dépasser la dose de 1000 g de métazachlore/ha sur une période de 3 ans en 1 ou plusieurs applications. Pour protéger les eaux souterraines, suite à une application sur colza d'hiver, ne pas appliquer NOVALL® ou tout autre produit contenant du quinmérac plus d'une année sur deux

CONTACTS UTILES

Pour plus d'informations techniques

BASF
France
Division
Agro

N°Azur 0 810 02 30 33
ou www.agro.basf.fr

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.agro.basf.fr

® : marques déposées BASF - 05/2017

Réf CASTOR : 125COHE0617R

Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

BASF France S.A.S. - Division Agro-

21 chemin de la Sauvegarde - 69134 ECULLY

Cedex

Tél. 04 72 32 45 45 - www.agro.basf.fr

Protection utilisateur lors préparation bouillie : gants en nitrile EN374, bottes, combinaison de travail polyester/coton (65%/35%) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.