

Herbicides Colza

**TANARIS<sup>®</sup> + NOVALL<sup>®</sup>,**

**Efficacité et souplesse au service du  
désherbage des colzas**

**BASF**  
We create chemistry



#### BENEFICES

- Efficacité sur un grand nombre d'adventices
- Souplesse d'utilisation en post-semis pré-levée ou post-levée précoce pour s'adapter à toutes les conditions

### EFFICACITE et SOUPLESSE au service du désherbage



### Champ d'action de TANARIS<sup>®</sup> 0,65L/ha + NOVALL<sup>®</sup> 1,3L/ha

Efficacité en %	Dicotylédones			Graminées
	Classiques	Diverses	Ombellifères	
Très sensible [95—100]	Alchémille des champs Capselle b.-à-pasteur Lamier sp. Matricaire sp. Stellaire Véronique de Perse	Arroche hastée		
Sensible [85—95]	Coquelicot Gaillet gratteron Laiteron sp. Myosotis Véronique à f. de lierre	Morelle Séneçon commun Shérardie des champs	Ammi majus Carotte sauvage Ethuse	Pâturin annuel
Moyennement sensible [70—85]	Euphorbe réveil-matin Fumeterre officinale	Sisymbre		Ray-grass Vulpin des champs
Peu sensible [50—70]				Vulpie queue de rat
Non sensible [0—50]		Géraniums		Repousse de céréales

# SOUPLESSE DE STADE D'APPLICATION



Tanaris® + Novall®

OU

Tanaris® + Novall®



**Post-semis pré-levée ou post-levée précoce, le pack s'adapte à vos conditions !**

Si les conditions le nécessitent (déficit hydrique, fortes précipitations à craindre dans 2-3 jours qui suivent le semis, sols très motteux ou caillouteux, terres filtrantes), le pack Tanaris® + Novall® peut s'appliquer en post-levée précoce (stade rayonnant, 70% des colzas au stade cotylédons)



**Dose pivot**



0,9 L/ha

0.9 L/ha

Dans tous les cas ne pas dépasser la dose maximale de 250 g/ha de quinmérac, soit une dose maximale de Tanaris® (0,9 L/ha) + Novall® (0,9 L/ha).

## QU'EST CE QUE TANARIS® + NOVALL®



	TANARIS®	NOVALL®
<b>AMM</b>	N° 2170158	N° 9000833
<b>Composition</b>	333 g/L de dmta-p + 167 g/L de quinmérac	400 g/L de métazachlore + 100 g/L de quinmérac
<b>Formulation</b>	Suspo-Emulsion (SE)	Suspension Concentrée (SC)
<b>Usages et doses autorisés</b>	Colza d'hiver, navette, cameline, moutarde : 1,5 L/ha Entre les stades BBCH 00 et BBCH 18	Colza—moutarde : 2,5 Lha—autres usages : consulter l'étiquette
<b>Classement</b>	<b>Mention d'avertissement : Attention</b>  H317 - H319 - H400 - H410	<b>Mention d'avertissement : Attention</b>  H317- H351- H400- H410
<b>ZNT Aquatique</b>	5 m	20 m
<b>ZNT (plantes non cibles)</b>	5 m	
<b>Nombre maximum d'applications</b>	1 application tous les 2 ans	1 application tous les 2 ans
<b>DAR</b>	DAR F (BBCH 18)	
<b>DRE</b>	48 heures	48 heures
<b>Autres aspects réglementaires</b>	Pour protéger les eaux souterraines, suite à une application sur colza d'hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du diméthénamide-P ou du quinmérac plus d'une année sur deux. Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45%.	Ne pas dépasser la dose de 1000 g de métazachlore/ha sur une période de 3 ans en 1 ou plusieurs applications. Pour protéger les eaux souterraines, suite à une application sur colza d'hiver, ne pas appliquer NOVALL® ou tout autre produit contenant du quinmérac plus d'une année sur deux

## CONTACTS UTILES

Pour plus d'informations techniques

**BASF**  
France  
Division  
Agro

N°Azur 0 810 02 30 33  
ou [www.agro.basf.fr](http://www.agro.basf.fr)

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Usages, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou [www.agro.basf.fr](http://www.agro.basf.fr)

® : marques déposées BASF - 05/2017

Réf CASTOR : 165COHE0517R

Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

**BASF France S.A.S. - Division Agro-**

21 chemin de la Sauvegarde - 69134 ECULLY  
Cedex

Tél. 04 72 32 45 45 - [www.agro.basf.fr](http://www.agro.basf.fr)

**Protection utilisateur lors préparation bouillie** : gants en nitrile EN374, bottes, combinaison de travail polyester/coton (65%/35%) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**