

# Cabrio® Top

Protéger, c'est dans sa nature.



**BASF**  
The Chemical Company



## POURQUOI CABRIO TOP ?



### Polyvalence

- CABRIO TOP associe au F500™ le métirame-zinc.
- Le métirame-zinc, fongicide de surface multisites, apporte une **action de contact**.
- CABRIO TOP est homologué sur mildiou, oidium, black-rot, brenner et excroissante.



Mildio



Oidio



Black-rot



Brenner



Excroissante



### Simplicité

- Un seul produit pour maîtriser toutes les maladies
- Pas de risque d'incompatibilité
- Limite les erreurs de dosage
- Adapté à la protection raisonnée
- Confort d'emploi



### Efficacité

- Cohérence de persistance d'action entre maladies, soit 14 jours pour mildiou, oidium, black-rot et rouget parasitaire
- Inutile de mélanger avec d'autres fongicides (anti-oidium, black-rot et rouget parasitaire)
- Limite la répétitivité des traitements
- A une action additionnelle sur *Botrytis* (observé dans les parcelles, mais non homologué)



### Un produit respectueux

- Respecte la qualité des vins : CABRIO TOP n'a aucune incidence sur le déroulement de la fermentation, les arômes, le goût des vins et des eaux-de-vie. F500 bénéficie d'une **import tolerance** aux USA et au Canada.
- Respecte les auxiliaires : CABRIO TOP est neutre à faiblement毒ique vis-à-vis des Typhlodromes.



# Cabrio®Top



Protéger, c'est dans sa nature.

## COMMENT S'UTILISE-T-IL ?

### Préconisations d'emploi

Cabrio®Top peut s'utiliser durant toute la période de sensibilité de la vigne aux maladies.

Pour valoriser pleinement ses caractéristiques exceptionnelles et sa polyvalence, un positionnement en encadrement de floraison est idéal.

Effectuer trois traitements, dont deux consécutifs au maximum, en intégrant un fongicide à mode d'action différent (non Q.o.i.) dans la séquence des trois traitements.

Cabrio®Top s'emploie à la cadence de 14 jours contre l'ensemble des maladies.

**Cet intervalle entre traitement sera réduit à 10-12 jours en cas de forte pression de la maladie et/ou de pousse active.**

**Cabrio®Top à 2 kg/ha**



**3 traitements  
en encadrement de floraison**  
(dont 2 consécutifs au maximum)

## QU'EST-CE QUE CABRIO TOP ?

**Cabrio®Top :** marque déposée BASF.

**Autorisation de vente N° :** 2000336.

**Composition :** 5 % de pyraclostrobine + 55 % de métirame-zinc.

**Formulation :** granulés dispersables (WG).

**Classement Toxicologique :** Xn : nocif. R22 : toxique par inhalation.

R38 : irritant pour la peau. AQUA : dangereux pour les organismes aquatiques.

**Usage et dose autorisée :** **mildiou** : 2 kg/ha,

**oïdium** : 1 kg/ha,

**black-rot** : 1,5 kg/ha,

**rougeot parasitaire** : 1,5 kg/ha,

**excoriose** : 0,15 kg/ha.

**Nombre maximum de traitements par an :** 3, pas plus de 2 consécutifs.

**Délai d'emploi avant récolte :** 35 jours.

**Délai de ré-entrée dans les parcelles :** 24 heures.

**Zone non traitée :** 20 mètres pour la dose de 2kg, 10 mètres pour 1 kg/ha.

**Conditionnement :** bidon de 6 kg pour 3 ha.

**Import tolérance :** exportation possible vers USA et Canada.

**Limite maximale de résidus :** **pyraclostrobine** : 2 p.p.m., **métirame-zinc** : 3 p.p.m.

**Précautions d'emploi lors de la préparation de la bouillie :** protection standard - Gants en nitrile ou néoprène EN374,

lunettes de sécurité ou masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtements de travail de niveau de protection 4. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi.

