

Cinch® Pro




La solution pour atteindre le rendement et la qualité

● La cible principale de Cinch® Pro : les fusarioSES

- A la floraison, les fusarioSES représentent un risque majeur pour la rentabilité des céréales : Perte de rendement (parfois extrême comme en 2008) et altération de la qualité sanitaire avec production de mycotoxines (DON). Le développement de *Fusarium roseum* est favorisé par une période chaude (20 à 25 °C) avec des orages et/ou de la pluie.



Performance du Cinch® Pro à la floraison sur *Fusarium roseum*

Essai 2008 Louresse (49) (variété ROYSSAC) – Photos des parcelles le 16 juin 2008



● La seule triazole anti-fusariose efficace sur Septoriose et Rouille brune

Protéger la dernière feuille, c'est préserver le potentiel de rendement de la culture. Un traitement au début de la floraison a aussi pour objectif de prolonger la protection contre la Septoriose et la Rouille brune.



Efficacités des principaux produits utilisés à la floraison

	Fusarium roseum	Septoriose	Rouille brune
Cinch® Pro 1L/ha			
Ref 3 1L/ha			
Ref 27 1,2L/ha			
Ref 12 0,8L/ha			




Les résultats obtenus par BASF et par Arvalis – Institut du végétal confirment les bonnes performances du metconazole sur Septoriose et sur Rouille brune.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI


Améliorer le rendement et la qualité de la récolte des blés

Résultats BASF Agro Centre Ouest 2008 : Moyenne 4 essais sur CAPHORN (49 + 17) - AUBUSSON (49) - ROYSSAC (17)

Taux de Mycotoxines (DON en ppb)



Rendement Brut en q/ha



Optimiser l'emploi de Cinch® Pro

Soit en traitement spécifique de l'épi
au stade optimum de protection contre les fusarioSES (début floraison : cf encadré) à la dose de 1L/ha seul.

Soit en traitement feuille + épis contre les maladies de fin de cycle comme la rouille brune et la septoriose, seul ou associé à une strobilurine à la dose de 0,8 L/ha.

Cinch® Pro

Dose : 0,8 L/ha à 1 L/ha.

★ Fiche d'identité Cinch® Pro :

Composition : Metconazole 90 g/l	Cultures	Usages	Doses
Formulation : SL	Blé tendre d'hiver, Blé dur d'hiver	FusarioSES des épis, septorioSES, rouilles brune et jaune, oïdium	1 l/ha
Autorisation de vente : n°2010283	Orge d'hiver Orge de printemps	Rouille naine, rynchosporioSE, oïdium	1 l/ha
Conditionnement : Bidon 5 l et 20 l	Seigle	Rouille brune, rynchosporioSE	1 l/ha
Classement toxicologique :	Avoine	Rouille couronnée	1 l/ha
Xn : nocif, R63 : Risques pendant la grossesse d'effets néfastes sur l'enfant AQUA / Dangereux pour les organismes aquatiques – Distance par rapport au point d'eau : respecter une zone non traitée de 5m (JO 21/09/06)	Triticale	Rouille brune, septorioSE	1 l/ha
Délai de rentrée dans la parcelle : 6 h (JO 21/09/06)	Féverole	Sclerotinia	0,8 l/ha
Délai Avant Récolte : Pois de conserve 14 jours - pois protéagineux, féverole, lupin 28 jours - Céréales 42 jours – Colza 45 jours	Pois, lupin, féverole	Anthracnose, botrytis, rouille	0,8 l/ha
Teneur Maximale en Résidus : Céréales 0,1 mg/Kg Pois, lupin 0,05 mg/Kg ; féverole : 0,02 mg/Kg ; Colza 0,1 mg/Kg	Colza	Phoma	0,6 l/ha
		Régulation de la croissance	0,8 l/ha
		CylindrosporioSE, oïdium, alternarioSE, sclerotiniOSE	0,8 l/ha

Objectif: une application au début floraison
(soit à la sortie des premières étamines).

