

DOSSIER TECHNIQUE

▲ Le désherbage en Pré-levée à large spectre en un seul passage



DAKOTA[®]
INNOVATION

Désherbage des maïs en Pré-levée

BASF

The Chemical Company

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI

Raisonner le désherbage de Pré-levée à spectre large


L'objectif premier

Le maïs est une culture particulièrement sensible à la concurrence des adventices pendant la première phase de son cycle. Le désherbage du maïs a pour objectifs essentiels de préserver le potentiel de récolte et sa qualité : les solutions techniques pour atteindre ces objectifs sont multiples. Il convient donc d'en raisonner le choix dès le départ.

Désherber en Pré en 1 seul passage

Appliqué aussitôt après le semis, le produit de Pré-levée à spectre large profite de l'humidité du sol pour entrer en action. Cette action va se prolonger sur une période de 70 à 100 jours pour préserver la culture pendant sa phase sensible : une solution qui convient aux flores très diversifiées, aux exploitations où la disponibilité pour intervenir est une contrainte.

Désherbage en 1 seul passage de Pré-levée
DAKOTA®-P appliqué à la dose de 3,5 - 4 L/ha.
Observations issues de 39 situations
représentatives des situations France.



Dans 70 % des situations, le désherbage en 1 seul passage avec DAKOTA®-P permet d'atteindre le niveau de satisfaction (7) tel que défini par Arvalis. Dans les autres situations, un passage raisonné en Post-levée a été appliqué.
 (source : 39 essais BASF Agro de 2006 à 2008).

Selon échelle Arvalis

■ Note > ou = 7 ■ Note < 7



pensée



renouée des oiseaux



véronique



mercuriale



pourpier



setaire



laiteron



Option sécurité : 1 Pré + 1 Post si nécessaire

Cette stratégie apporte la sécurité nécessaire dans les situations de flore mixte constituées de graminées estivales, de dicots classiques, difficiles ou spécifiques à une région.

La Pré-levée permet de préparer et de simplifier la Post-levée : elle retarde et regroupe les levées.



Combiner le désherbage chimique et mécanique

Le maïs est une culture dont l'écartement entre les rangs permet d'envisager les stratégies de désherbage mixte.

La stratégie qui comporte une application herbicide en Pré-levée, suivi d'un binage, présente une bonne sélectivité sur la culture. Parce que les interventions mécaniques sur maïs jeune sont délicates, l'intervention herbicide de Pré-levée va faciliter le contrôle mécanique ultérieur en groupant les levées.

Au travers de ce dossier technique, découvrez toutes les caractéristiques de DAKOTA®-P pour l'intégrer parfaitement dans votre raisonnement du désherbage.

sommaire

Comprendre le fonctionnement de DAKOTA®-P	p 4 - 5
Champ d'activité et régularité des performances	p 6 - 7
Relation efficacité - Dose d'emploi	p 8
Complément d'efficacité avec l'isoxaflutole	p 9
Comparaison aux solutions de référence	p 10 - 11
Préconisations techniques	p 12 - 13
Raisonner les interventions en fonction du climat	p 14 - 15
Raisonner les interventions de DAKOTA®-P en fonction de la flore	p 16 - 17
Fiches d'identité et mentions légales	p 18
10 gestes responsables	p 19



Comprendre le fonctionnement de DAKOTA®-P

DAKOTA®-P est composé de deux substances actives complémentaires : la pendiméthaline et le dmta-p.

Mode d'action

Le dmta-p

Le dmta-p appartient à la famille des chloroacétamides. Les chloroacétamides agissent entre autres, par inhibition de la biosynthèse des protéines, mais aussi des lipides et des gibberellines. L'action du dmta-p se traduit par une inhibition de l'émergence des plantes sensibles en bloquant leur croissance rapidement après la germination. Les adventices sont donc principalement détruites avant leur émergence. Celles qui lèvent, restent naines et déformées.

Le dmta-p est absorbé par les organes souterrains, principalement au niveau du coléoptile chez les graminées ou de l'hypocotyle chez les dicotylédones.


La pendiméthaline

La pendiméthaline fait partie de la famille des dinitroanilines. Inhibitrice de la division cellulaire, elle bloque la formation des microtubules du fuseau chromatique.

La pendiméthaline est principalement absorbée par les organes souterrains en croissance juste après la germination lors de la phase de développement des plantules. Elle peut également, mais dans une moindre mesure, être absorbée par les premières feuilles, encore jeunes.

Compte tenu de son mode d'action, la pendiméthaline sera efficace sur des adventices jeunes, au moment de leur germination ou en cours de levée.


Adventices graminées



Zones d'absorptions

- ➡ principale
- ➡ secondaire

Adventices dicotylédones



Substances actives

- | | |
|----------------|--|
| dmta-p | |
| pendiméthaline | |



Propriétés biologiques

Le dmta-p

Le mode d'absorption particulier du dmta-p en fait avant tout une molécule graminicide (graminées estivales : digitaire sanguine, panic pied-de-coq, sétaire verte, sétaire verticillée, sétaire glauque, etc). Il apporte également une efficacité complémentaire sur un certain nombre de dicotylédones.

La pendiméthaline

La pendiméthaline est efficace sur un grand nombre d'adventices dicotylédones et graminées. La pendiméthaline permet également une bonne maîtrise des graminées, notamment des graminées estivales telles que panics, sétaires et digitaires, et présente l'intérêt d'apporter un mode d'action différent des anti-graminées les plus utilisés sur maïs (chloroacétamides, sulfonylurées).

SÉLECTIVITÉ

DAKOTA®-P n'a pas d'action herbicide sur la plante de maïs. En effet, les 2 substances actives bénéficient d'une sélectivité de position sur cette culture : les 2 substances actives, positionnées dans les premiers millimètres du sol suite à son application, empêchent la levée des adventices qui germent dans cet horizon de surface. Les semences de maïs, enfouies plus profondément, ne sont pas en contact avec le produit. Elles germent et lèvent normalement.



Champ d'activité et régularité des performances

Un champ d'action très complet

DAKOTA®-P présente un large champ d'action sur les principales graminées et dicotylédones adventices des cultures de maïs. À l'origine de ce spectre large, le dmta-p et la pendiméthaline font preuve d'une très bonne complémentarité.

Appliquer DAKOTA®-P permet de minimiser, voire d'éviter en fonction des situations, les compléments de désherbage en Post-levée. DAKOTA®-P répond parfaitement aux besoins des agriculteurs soucieux de disposer d'un produit complet utilisable dès les semis sans avoir recours aux mélanges.

Champ d'activité de DAKOTA®-P appliqué à 3,5 - 4 L/ha

185 essais BASF Agro en France jusqu'en 2008 - Toutes situations confondues*.

	Nombre d'essais	Infestations moyennes dans témoins [pl./m ²]	DAKOTA®-P % efficacité
GRAMINÉES ESTIVALES			
Digitaires sp.	37	29	95,5
Panic pied-de-coq	67	44	97,3
Setaires sp.	54	41	92,8
AUTRES GRAMINÉES ANNUELLES			
Paturin annuel	11	62	98,1
Ray-grass d'italie	1	25	85,0
Vulpin	5	29	56,9
DICOTYLÉDONES CLASSIQUES			
Amarantes sp.	40	22	94,8
Chénopodes sp.	129	37	95,7
Morelle noire	70	29	96,6
Renouée persicaire (et à f. de Patience)	58	25	92,4
DICOTYLÉDONES DIFFICILES			
Ambroisie à f. d'Armoise	3	15	50,6
Arroches sp.	7	20	88,4
Datura stramoine	7	7	88,1
Fumeterre officinal	4	19	94,6
Gaillet gratteron	3	10	89,5
Laiterons sp. (issus de graines)	23	41	85,9
Linaires sp.	9	10	96,1
Mercuriale annuelle	30	23	76,6
Pensée des champs	14	35	88,8
Renouée des oiseaux	30	20	97,3
Renouée liseron	27	19	80,9
Véroniques sp.	13	32	99,7
DICOTYLÉDONES DIVERSES**			
Capselle bourse-à-pasteur	13	48	97,0
Colza (repousses)	3	20	52,2
Lamier pourpre	7	32	99,6
Matricaire camomille	18	28	97,6
Mouron des champs	7	17	99,5
Pourpier potager	3	10	100,0
Ravenelle	6	8	86,3
Rumex sp. (issus de graines)	3	45	96,2
Sanve	12	21	87,9
Séneçon commun	26	23	88,5
Stellaire	32	24	99,0

Très sensible (TS) > 95 %
 Sensible (S) 85-95 %
 Moyennement sensible (MS) 70-85 %
 Peu sensible (PS) 50-70 %
 Très peu sensible (TPS) < 50 %

* Synthèse de tous les essais conduits dans diverses situations pédo-climatiques (de favorables à défavorables).
 ** Sont classées comme dicotylédones diverses des adventices d'importance régionale.

Efficacité de DAKOTA®-P en Pré-levée 1 passage




Photo issue de grandes parcelles désherbées en 2009 - Photo Pascal Lacroix, BASF Agro.




Graminées estivales : grande régularité des performances de DAKOTA®-P

185 essais BASF Agro en France jusqu'en 2008.
Toutes situations confondues*.




Régularité d'action sur les quatre dicotylédones classiques : les performances sont très homogènes

185 essais BASF Agro en France jusqu'en 2008.
Toutes situations confondues*.



DAKOTA®-P fait preuve d'une très grande régularité d'action sur les quatre dicotylédones les plus fréquentes en culture de maïs : l'amarante, le chénopode, la morelle noire et la renouée persiciare ainsi que sur les graminées estivales (panics, sétaires et digitaires).



* Synthèse de tous les essais conduits dans diverses situations pédo-climatiques (de favorables à défavorables).

Relation efficacité Dose d'emploi

Sensibilité des adventices

DAKOTA®-P appliqué en Pré-levée

Relation efficacité / dose d'emploi.

Effet dose entre 3 à 3,5 et 4 L/ha.

73 essais BASF Europe - Comparaison orthogonale.

	Nombre d'essais	Infestations moyennes dans témoins [pl./m ²]	DAKOTA®-P (3 à 3,5 L/ha)	DAKOTA®-P (4 L/ha)
GRAMINÉES				
Digitaires sp.	6	21	92,2	94,9
Panic pied-de-coq	25	16	93,2	94,8
Sétaires sp.	18	20	93,4	96,7
Paturin annuel	14	26	94,3	95,8
DICOTYLÉDONES CLASSIQUES				
Amarantes sp.	20	14	98,5	98,8
Chénopodes sp.	53	26	95,6	97,7
Renouée persicaire (et à f. de p.)	14	24	88,5	93,3
Morelle	33	32	91,0	92,7
DICOTYLÉDONES DIFFICILES				
Ambroisie	1	2	73,3	83,3
Arroche étalée	2	14	86,6	91,4
Datura	3	16	89,9	95,6
Fumeterre	2	4	83,7	89,8
Laïterons sp.	4	8	95,2	98,1
Lampourde	1	8	91,7	98,0
Linaires sp.	2	4	100,0	100,0
Mercuriale annuelle	11	14	69,9	75,8
Pensée des champs	1	3	83,8	94,8
Renouée des oiseaux	7	8	99,2	99,2
Renouée liseron	15	9	66,8	72,9
DICOTYLÉDONES DIVERSES				
Abutilon	5	16	77,2	81,0
Capselle	3	45	86,2	89,4
Colza (repousses)	3	4	76,9	89,8
Coquelicot	1	6	100,0	100,0
Galinsoga	1	37	100,0	100,0
Lamiers sp.	1	3	100,0	100,0
Matricaire camomille	6	8	98,8	99,3
Mouron des champs	1	5	100,0	100,0
Ravenelle	1	22	81,7	75,0
Sanve	1	3	76,3	83,3
Séneçon	7	13	83,7	85,5
Stellaire	13	19	90,4	92,4
Tabouret des champs	2	3	62,6	96,0

Très sensible (TS) > 95 %
Sensible (S) 85-95 %
Moyennement sensible (MS) 70-85 %
Peu sensible (PS) 50-70 %
Très peu sensible (TPS) < 50 %


Complément d'efficacité avec l'isoxaflutole (IFT)




Spectre d'efficacité de DAKOTA®-P seul et avec un complément IFT

Dans les situations de désherbage difficile (fortes pressions d'adventices, flores difficiles, conditions sèches, mauvaises préparations de sol, etc...), l'ajout d'un produit à base d'IFT va permettre de :

- régulariser l'effet sur amarantes, chénopodes, renouée persicaire et morelle,
- compléter l'efficacité sur datura, mercuriale, fumeterre, renouée liseron, crucifères (sanve, ravenelle, repousses de colza), séneçon,
- "limiter" les infestations d'ambroisie.



* Synthèse de tous les essais conduits dans diverses situations pédo-climatiques (de favorables à défavorables).



25 essais BASF Agro de 2006 à 2008 où la notation de satisfaction a été réalisée.

Efficacité de l'association avec l'IFT selon l'échelle d'Arvalis

Désherbage en 1 seul passage de Pré-levée

DAKOTA®-P appliquée à la dose de 3,5 - 4 L/ha + IFT.


Observations détaillées dans 25 situations représentatives de la moyenne des situations.

L'addition d'un produit à base d'IFT à DAKOTA®-P, permet de désherber en 1 passage en Pré-levée dans 84 % des situations testées (atteindre le niveau de satisfaction 7 tel que défini par Arvalis).

Dans les quatre situations, un passage raisonné en Post-levée a été appliqué.


Comparaison aux solutions de référence

DAKOTA®-P comparé à la référence C appliqué en Pré-levée



Persistante de DAKOTA®-P sur graminées appliquée en Pré-levée

Sur graminées estivales, DAKOTA®-P présente une plus grande persistante d'action.



Champ d'action de DAKOTA®-P comparé à l'association Réf. T + Réf. L

Champ d'action comparé des 2 solutions :

Sur les graminées et sur les dicotylédones classiques, DAKOTA®-P offre des performances très proches de l'association Réf. T + Réf. L.

Sur 2 dicots difficiles et fréquentes, la mercuriale et la renouée des oiseaux, DAKOTA®-P se distingue significativement. Face à la problématique de l'ambroisie, le recours à l'IFT sera nécessaire.



Relation coût / efficacité :

DAKOTA®-P, produit prêt à l'emploi, offre une efficacité de haut niveau sans avoir recours aux mélanges. Il répondra aux attentes des agriculteurs en recherche du meilleur rapport efficacité/coût.

DAKOTA®-P appliqué en Pré-levée

en comparaison à la solution de référence Réf. T + Réf. L.


41 essais BASF Agro - Comparaison orthogonale - Observations 60 jours après l'application.

	Nombre d'essais	Infestations moyennes dans témoins [pl./m ²]	DAKOTA®-P (3,5 à 4 L/ha)	Réf. T + Réf. L (3,5-4,0 + 0,5-0,8 L/ha)
GRAMINÉES				
Digitaire sanguine	11	25	92,7	90,8
Panic pied-de-coq	20	47	95,5	97,2
Sétaires sp.	12	57	93,4	97,1
DICOTYLÉDONES CLASSIQUES				
Amarante réflechie	10	24	95,1	98,9
Chénopodes sp.	32	54	96,7	98,9
Morelle	11	37	97,5	98,8
Renouée persicaire (et à f. de p.)	16	19	94,3	96,1
DICOTYLÉDONES DIFFICILES				
Ambroisie	1	13	80,3	100,0
Arroche étalée	1	5	89,0	76,7
Datura	1	2	98,3	96,7
Gaillet	1	2	94,5	96,5
Laiteron sp.	5	7	89,7	96,0
Mercuriale annuelle	5	47	90,6	82,8
Pensée des champs	2	7	92,5	97,2
Renouée des oiseaux	6	15	91,6	76,6
Renouée liseron	7	13	80,4	77,3
Véroniques sp.	2	9	100,0	96,7
DICOTYLÉDONES DIVERSES				
Capselle	2	9	94,7	100,0
Lamier pourpre	1	31	100,0	100,0
Matricaire camomille	4	8	91,9	96,3
Mouron des champs	4	10	99,2	100,0
Pourpier	1	8	100,0	98,3
Ravenelle	2	5	81,3	99,3
Rumex sp.	1	4	100,0	100,0
Sanve	3	14	86,3	91,7
Séneçon	5	14	87,2	99,3
Stellaire	4	15	100,0	100,0

Très sensible (TS)	> 95 %
Sensible (S)	85-95 %
Moyennement sensible (MS)	70-85 %
Peu sensible (PS)	50-70 %
Très peu sensible (TPS)	< 50 %

Essai de Taupont (35) Efficacité sur mercuriale et renouée liseron

Application de Pré-levée sur une flore caractérisée par une infestation forte de 2 dicots difficiles : la mercuriale et la renouée liseron. Les 2 matières actives de DAKOTA®-P permettent d'atteindre un bon niveau d'efficacité sur les mercuriales quand elles profitent d'une bonne humidité du sol.



Essai BASF Agro - Notation du 01/07/09.
Témoin 160 mercuriales/m² - 40 renouées liseron/m².

Préconisations techniques

Choix de stratégie à priori

Stratégie de désherbage mise en œuvre	Flore de la parcelle Pression attendue			
	Graminées estivales	Dicotylédones classiques	Dicotylédones sensibles à l'IFT*	Dicotylédones difficiles**
Stratégie 1 passage de Pré-levée	+++	+++		
	+++	+++	●	
	+	+++	●	
Stratégie Pré-levée puis Post-levée	+	+++		●
	+++	+++		●

Une dose adaptée pour chaque type de sol

Pour une efficacité et une sélectivité optimales, il convient de raisonner la dose de DAKOTA®-P en fonction des caractéristiques pédologiques et du taux de matière organique du sol :

Type de sol	Terres à tendance sableuse, limoneuse, filtrante ou battante : sols limono-sableux, limoneux fins, limoneux fins argileux, sablo-limoneux.		Terres bien pourvues en argile (> 30 % argile) Terres franches (20 à 30 % argile) : sols argileux, argileux-sableux, argilo-limoneux, limono-argileux, limono-argileux fins, limono-argileux sableux, limoneux.
Taux de Matière Organique du sol	< 3 %	> 3 %	indifférent
DAKOTA®-P Dose conseillée	3 à 3,5 L/ha	3,5 à 4 L/ha	4 L/ha

L'utilisation de DAKOTA®-P est déconseillée en sols très filtrants (teneur en sable > 80 %), ou très battants (teneur en limon > 85 %). Par ailleurs, DAKOTA®-P présente un risque accru de manque de sélectivité sur semis mal recouverts.

Pour les situations particulières, demander conseil auprès de votre interlocuteur BASF Agro.



Préconisations		
nes **	Pré-levée	Post-levée
	DAKOTA®-P (4 L/ha)	-
	DAKOTA®-P (4 L/ha) + partenaire à base d'IFT	-
	DAKOTA®-P (3,5 L/ha) + partenaire à base d'IFT	-
	DAKOTA®-P (3 à 3,5 L/ha)	Rattrapage raisonné
	DAKOTA®-P (4 L/ha)	Rattrapage raisonné

+++ pression attendue moyenne à forte

++ pression attendue faible

● présence attendue

* Crucifères, ambroisies, sénéçon, datura, renouée liseron, renouée persicaire, etc.

** Ambroisie, mercuriale, fortes populations de renouée liseron et renouée persicaire, arroches, datura, etc.

Gestion des adventices dans la rotation

Par ailleurs, l'association de deux molécules à modes d'action différents présente un atout supplémentaire dans le cadre de la prévention de la résistance. Le dmtpa-p appartient au groupe K3 de la classification HRAC*.

La pendiméthaline fait partie de la famille des dinitroanilines, du groupe K1 de la classification HRAC*. Compte tenu de leur mode d'action, ces 2 matières actives sont peu concernées par les phénomènes de résistance aux herbicides bien qu'elles soient largement représentées au niveau mondial. À ce titre, elles constituent des alternatives à d'autres modes d'action, plus sensibles aux phénomènes de résistance. Elles jouent un rôle important dans la gestion des graminées dans les rotations.

*HRAC : Herbicide Resistance Action Committee

Effets sur les cultures suivantes


Pour les cultures sur lesquelles la pendiméthaline et le dmtpa-p ne sont pas autorisés, il conviendra d'attendre 140 jours avant d'implanter une céréale et 300 jours avant d'implanter une autre culture.

Retournement de la culture

En cas de destruction accidentelle de la culture traitée avec DAKOTA®-P, il est possible de réimplanter un maïs après un labour profond.

Raisonner les interventions en fonction du climat

En Pré-levée



Les avantages de la Pré-levée

Suppression précoce de la concurrence des mauvaises herbes.

► Le potentiel de rendement est préservé dès le semis.

Simplification : pas de souci pour choisir le moment opportun pour traiter.

► Moins de préoccupations techniques.

Un seul produit, pas d'hésitation sur les choix des produits, partenaires et doses.


► Gain de temps.

Alternance des matières actives dans la rotation, prévention de l'apparition de résistance.

► La Pré-levée permet d'introduire dans la rotation d'autres modes d'actions peu exploités (ex : chloroactémides, dinitroanilines...).



En Post-levée précoce



Application de DAKOTA®-P en Post-levée précoce

État de la flore au moment de l'application	Préconisations en Post-levée
les adventices ne sont pas encore levées (voire 1 à 2 feuilles des graminées ou stade levée des dicots dans des conditions très favorables)	DAKOTA®-P (3,5 à 4 L/ha)
présence de dicotylédones uniquement	DAKOTA®-P (3,5 à 4 L/ha) + partenaire AD adapté
présence à la fois de dicotylédones et de graminées	DAKOTA®-P (3 à 4 L/ha) + partenaire AD (antidicots) adapté + SU AG (Sulfonylurées anti-graminées)

Remarque : ne pas appliquer sur maïs en cours de levée (maïs pointant).

Raisonner les interventions de DAKOTA®-P en fonction de la flore

DAKOTA®-P : efficacité sur les principales adventices en fonction de la stratégie de désherbage


Application en Pré-levée	Pré-levée		DAKOTA®-P (3,5 à 4 L/ha)	DAKOTA®-P (3,5 à 4 L/ha) puis BASAMAÏS® (2,5 L/ha)	DAKOTA®-P (3,5 à 4 L/ha) puis BASAMAÏS® (2,5 L/ha) (0,5 L/ha)			
	DAKOTA®-P (4 L/ha)	DAKOTA®-P (3 à 4 L/ha) + produit à base d'IFT						
Application en Post-levée								
GRAMINÉES ESTIVALES								
Digitaires sp.	■	■	■	■	■			
Panic pied-de-coq	■	■	■	■	■			
Setaires sp.	■	■	■	■	■			
AUTRES GRAMINÉES ANNUELLES								
Paturin annuel	■	■	■	■	■			
Ray-grass d'italie	■	■	■	■	■			
Vulpin	■	■	■	■	■			
DICOTYLÉDONES CLASSIQUES								
Amarantes sp.	■	■	■	■	■			
Chénopodes sp.	■	■	■	■	■			
Morelle noire	■	■	■	■	■			
Renouée persicaire (et à f. de Patience)	■	■	■	■	■			
DICOTYLÉDONES DIFFICILES								
Ambroisie à f. d'Armoise	■	■	■	■	■			
Arroches sp.	■	■	■	■	■			
Datura stramoine	■	■	■	■	■			
Fumeterre officinal	■	■	■	■	■			
Gaillet gratteron	■	■	■	■	■			
Laîterons sp. (issus de graines)	■	■	■	■	■			
Linaires sp.	■	■	■	■	■			
Mercuriale annuelle	■	■	■	■	■			
Renouée des oiseaux	■	■	■	■	■			
Renouée liseron	■	■	■	■	■			
Véroniques sp.	■	■	■	■	■			
DICOTYLÉDONES DIVERSES								
Capselle bourse-à-pasteur	■	■	■	■	■			
Colza (repousses)	■	■	■	■	■			
Lamier pourpre	■	■	■	■	■			
Matricaire camomille	■	■	■	■	■			
Mouron des champs	■	■	■	■	■			
Pensée des champs	■	■	■	■	■			
Pourpier potager	■	■	■	■	■			
Ravenelle	■	■	■	■	■			
Rumex sp. (issus de graines)	■	■	■	■	■			
Sanve	■	■	■	■	■			
Séneçon commun	■	■	■	■	■			
Stellaire	■	■	■	■	■			

Remarques : efficacité attendue dans la mesure où les conditions de mise en œuvre sont respectées (application sur sol frais pour la Pré-levée, application sur des adventices jeunes pour la Post-levée précoce, etc).

Basamaïs® : 480 g/L bentazone – Autorisation de vente n° 9100065 – Xn, N – R22 – R36 – R43 – R50/53.



re





Fiche d'identité

DAKOTA[®]P : marque déposée BASF

- **Autorisation de vente N° :** 2090113.
 - **Composition :** 212,5 g/L de dmta-p + 250 g/L de pendiméthaline.
 - **Formulation :** EC (Concentré émulsionable).
 - **Usages autorisés :** maïs, sorgho, millet, moha, miscanthus selon l'arrêté du 12/06/2009.
 - **Doses autorisées :** 4 L/ha.
 - **Classement toxicologique :** N (Dangereux pour l'environnement) Xn (Nocif), R22 (Nocif en cas d'ingestion), R38 (Irritant pour la peau), R43 (Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau), R50/53 (Très toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).
 - **Nombre maximum d'applications par an :** 1 tous les 2 ans.
- Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer Dakota P ou tout autre produit contenant du dmta-p plus d'une fois tous les deux ans sur la même parcelle.
- **Délai avant récolte (DAR) :** 100 jours grain/90 jours pour le fourrage.
 - **Distance aux points d'eau :** respecter une zone non traitée (ZNT) de 20 m.
 - **Délai de rentrée dans la culture :** 48 heures après le traitement.

Respecter, pour les cultures entrant dans la rotation et pour lesquelles aucune autorisation de préparation à base de pendiméthaline ou de dmta-p n'existe, un délai de 140 jours pour céréales et de 300 jours pour les autres cultures entre l'application du produit contenant de la pendiméthaline ou du dmta-p et le semis ou la plantation de culture suivantes.



Protection de l'utilisateur lors de la manipulation des produits :

gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4

Dangereux - Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi.

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION



1 ►

Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.



2 ►

Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi.



3 ►

Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).



4 ►

Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.



5 ►

Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).



6 ►

Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor.



PENDANT L'APPLICATION



7 ►

Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.



APRÈS L'APPLICATION



8 ►

Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.



9 ►

Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.



10 ►

Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande le procédé Osmofilm®



® Marque déposée Sté PANTEK France

Contacts utiles

Informations techniques FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 <small>PRIX APPEL LOCAL</small>	ou www.agro.bASF.fr
Une question de santé	MSA	N°Vert 0 800 887 887 <small>APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE</small>	
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33	
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0 810 12 18 85 <small>PRIX APPEL LOCAL</small>	ou www.adivalor.fr

DAKOTA[®]_P, pour :

- Capitaliser sur une protection de 70 à 100 jours contre la concurrence des adventices durant la phase sensible du maïs.
- Maîtriser les fortes pressions de graminées estivales dès le départ.
- Contrôler des dicots difficiles telles que renouées des oiseaux, véroniques, pensées, mercuriales.

DUREE NE CORRIGANTE SCARLET Novembre 2009 - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF Agro qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. 648MAHBE5079R.
Crédit photos : Wattier/Getty Images/BASF Agro.

BASF Agro S.A.S.
21 chemin de la Sauvegarde
69134 ECULLY cedex
Tel. 04 72 32 45 45
www.agro.bASF.fr

 **BASF**
The Chemical Company