

# Les semis de blés ont commencé

Pour que vos céréales démarrent dans de bonnes conditions


Pensez à les désherber dès que possible

**BASF**  
We create chemistry


PRE + POST  
PRECOCE

**ARANDA® : La souplesse d'utilisation en pré et post-précoce**

## → Le positionnement à l'automne



## → Une bonne efficacité sur Ray-gras, vulpin et dicotylédones



## Carte d'identité produit

Marque déposée BASF.

**Autorisation de vente :** n° 2090118

**Composition :** flufenacet (60 g/L) + pendiméthaline (300 g/L)

**Formulation et conditionnement :** EC (Concentré émulsionnable)

**Classement toxicologique :** DANGER



H302 : Nocif en cas d'ingestion.

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Conditionnement :** 10L

**Usages et doses autorisées :** Blé tendre d'hiver, Orge d'hiver et Triticale :

2,5 L/ha

**Nombre d'application maximum :** 1 par an

**Stade limite d'utilisation :** mi-tallage (BBCH 25)

**Distance aux points d'eau :** respecter une zone non traitée (ZNT) de 20 mètres

**Délai de rentrée dans la parcelle :** 24 heures

**Protection utilisateur lors préparation bouillie :** gants en nitrile EN374, bottes, combinaison de travail polyester/coton (65%/35%) déperlante, blouse Cat III type PB 3 manches longues, lunettes de sécurité ou écran facial.

Porter des gants et un vêtement de protection pendant toutes les phases d'utilisation de la préparation. Contient de la pendiméthaline et du flufenacet - peut déclencher une réaction allergique. Pour les cultures entrant dans la rotation et sur lesquelles la pendiméthaline n'est pas autorisée, respecter un délai de : \* légumes racines et tubercules : 190 jours ; légumes bulbes et feuilles : 200 j ; betterave à sucre : 300 j. ; semis d'avoine : 200 j. ; crucifères oléagineuses : 250 j, autres cultures : 200 jours.

Septembre 2014 - 332CEHE0914NORD - Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF Agro (0.810.023.033) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. Usage, doses et conditions d'emploi, consulter : [www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr)

**BASF France S.A.S. - Division Agro - 21 chemin de la Sauvegarde**

**69134 Ecully Cedex - Tél : 04.72.32.45.45.**

Afin d'assurer la bonne sélectivité de la préparation :

### Types de sol:

Traiter sur un sol bien préparé, exempt de grosses mottes et de débris végétaux. Ne pas utiliser sur un sol sableux, un sol hydromorphe ou très caillouteux.

### Etat de la culture:

S'assurer d'un semis régulier et de profondeur suffisante (>2,5 cm). Ne pas rouler ou herser la culture dans les jours qui précédent ou suivent l'application. Dans le cas d'application de post-levée, ne pas traiter sur céréales stressées, déchaussées (par le gel) ou en mauvais état végétatif.

### Conditions du milieu:

Ne pas traiter si des pluies importantes sont annoncées dans les jours suivant le traitement. L'humidité du sol, avant et après l'application, optimise l'efficacité de **Aranda**. Le traitement à des températures proches de 0°C est possible, en évitant les applications en périodes de fortes amplitudes thermiques et de gel intense prolongé.

### 10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

#### AVANT L'APPLICATION

-  1 Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
-  2 Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.
-  3 Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
-  4 Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
-  5 Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
-  6 Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve, ou utiliser l'incorporateur.

#### PENDANT L'APPLICATION

-  7 Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau. Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

#### APRÈS L'APPLICATION

-  8 Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
-  9 Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
-  10 Recycler les emballages dans le cadre des collectes **ADIVALOR**. Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, **BASF Agro** recommande Osmofilm®.

### Contacts utiles

Informations techniques Étiquettes et FDS	BASF Agro	 N°Azur 0 810 02 30 33 ou <a href="http://www.agro.bASF.fr">www.agro.bASF.fr</a>
Une question de santé	MSA	 Phyt'attitude  N°Vert 0 800 887 887 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	 N°Azur 0 810 12 18 85 ou <a href="http://www.adivalor.fr">www.adivalor.fr</a>