


EVIDAN®

Le traitement pied + feuille qui contrôle vraiment la septoriose

■ Un spectre d'action complet pour lutter contre toutes les maladies de début de cycle

Avec EVIDAN, l'ensemble des maladies du premier traitement est maîtrisé, gage de rentabilité.



| | | Piétin verse | Oïdium | Septo | Rouille jaune | rouille brune | Fusa roséum | M. nivale |
|---------------|--|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| EVIDAN | fluquinconazole 54g/l + prochloraz 174g/l | 2,6 | 2 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2 | |
| Ref E | tébuconazole 133g/l + prochloraz 267g/l | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | |
| Ref B | tétraconazole 66,7g/l + prochloraz 300g/l | 2 | 1,5 | 1,5 | | | | |
| Ref T | propiconazole 90g/l + prochloraz 400g/l | 1,25 | | 1,25 | | | | |

Légende EFFICACITÉ


- bonne
- moyenne
- faible
- Non autorisé

Source dépliant Arvalis 06/07


■ Un premier traitement performant pour construire les programmes fongicides les plus rentables.

En 2006, comme en 2005, la hiérarchie des triazoles est confirmée : EVIDAN est bien l'une des meilleures solutions anti-septoriose du marché.

Efficacité septoriose sur F1(%)



Rendement brut et Rendement net q/ha
(coût du traitement déduit)



Comparaison pluriannuelle des triazoles – Région Centre-Ouest N = 3 (2005-2006)

Application BBCH 32-33 Couverture HORIZON BBCH 61

Evidan : ® marque déposée BASF. 54 g/l de fluquinconazole + 174 g/l de prochloraz A.V. n° 9900130. Doses autorisées : 2,6 l/ha (piétin-verse), 2,3 l/ha (rouilles), 1,8 l/ha (oidium, fusarioses), 1,8 l/ha (septorioses). Formulation SE. Xn. R22 R36 R40 R48/22 Aqua. ZNT : 5m. Délai de rentrée : 24 heures. DAR : 42 jours. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Novembre 2006. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF Agro : 0810 023 033 qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

■ Complémentarité du fluquinconazole et du prochloraze sur l'ensemble des souches de septoriose

| Fongicides | CI50 en mg/l TriS | Niveaux de résistance ^a – Phénotypes TriR | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--|-------|--------|----|----|-------|-----|
| | | TriLR | | | | | TriMR | |
| | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| Prochloraze | 0,002 | -/+ | + | + / ++ | + | ++ | + | - |
| Fluquinconazole | 0,003 | - | - / + | - | + | ++ | ++ | ++ |
| Triazole a | 0,006 | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ |

Source :
Arvalis/Inra
réseau
performance
2006

^a. Niveaux de résistance : CI₅₀ TriR/CI₅₀ TriS : Échelle – (entre 0,3 et 3) ; + (entre 3 et 10), ++ (entre 10 et 30), +++ (entre 30 et 100)

L'excellente complémentarité entre fluquinconazole et prochloraze permet un haut niveau de performances sur l'ensemble des souches de septorioses : TriLR et TriMR




■ Une formulation innovante qui augmente les performances

Formation d'un double réservoir pour une efficacité sur et dans la feuille. Le Maximiseur confère une plus grande persistance d'action permettant ainsi le meilleur positionnement du deuxième traitement.

■ EVIDAN : un outil pour raisonner la protection fongicide

Un traitement raisonné, adapté à chaque situation



EVIDAN®

Composition :

fluquinconazole 54 g/l + prochloraze 174 g/l

Formulation :

SE

Doses :

2,3 l/ha (Piétin-verse, Oïdium, Septoriose, Rouilles et Fusarioses)
2,0 l/ha (Oïdium, Septoriose, Rouilles et Fusarioses)
1,8 l/ha (Septoriose)