

NE LAISSEZ PAS TOMBER VOS CEREALES !

UN RISQUE DE VERSE IMPORTANT

Les bonnes conditions à l'automne puis un hiver particulièrement doux ont favorisé non seulement de bonnes levées mais aussi le tallage (une à 2 talles supplémentaires par rapport à une année "normale"). Le risque d'étiollement est donc important. Il faut ajouter à cela des conditions favorables à la minéralisation.


DES POTENTIELS PROMETTEURS

Le contexte marché doit inciter d'autant plus à préserver au mieux tous les quintaux pour viser la meilleure rentabilité de ses céréales.

DES DEGATS A NE PAS OUBLIER


La verse a pour conséquence :

- la chute de rendement
- la chute de la qualité (PS, qualité sanitaire)
- du temps et des frais de récolte et séchage



POUR FAIRE FACE A TOUTES LES SITUATIONS

- ➔ Puissance reconnue
- ➔ Souplesse d'emploi
- ➔ Polyvalence cultures



Températures minimales requises		
Jour du traitement		Dans les 3 jours suivants T° moyenne requise
Mini enregistré > à	Température requise >	
+ 2°C	+ 8°C	+ 8°C


Appliquer sur des céréales en bonne santé, éviter les situations de fortes amplitudes thermiques accompagnées de gelées nocturnes. Eviter de traiter au-dessus de 25°C.

Nos préconisations régionales : Poitou-Charente

Sur blé tendre d'hiver

Risque de verse

Fort



Cycocel® C5
BASF : 2 l/ha

MÉDAX® TOP
0,8 à 0,6 l/ha

ou


MÉDAX® TOP
0,8 l/ha

Moyen à faible

MÉDAX® TOP
0,8 à 0,7 l/ha

Sur blé dur d'hiver

Application unique



MÉDAX® TOP
0,8 à 0,7 l/ha


En programme

Cycocel® C5
BASF : 2 l/ha

MÉDAX® TOP
0,8 à 0,6 l/ha

Sur orge d'hiver

Application unique



MÉDAX® TOP
1 à 0,8 l/ha

ou

MÉDAX® TOP + éthéphon
0,8 à 0,6 l/ha + 0,4 à 0,3 l/ha

En programme

MÉDAX® TOP
1 à 0,6 l/ha

éthéphon
0,5 à 0,3 l/ha


Si risque fort

MÉDAX® TOP + éthéphon
0,8 à 0,6 l/ha + 0,4 à 0,3 l/ha

éthéphon
0,5 à 0,3 l/ha

Sur orge de printemps

Application unique



MÉDAX® TOP
0,8 à 0,6 l/ha

ou

MÉDAX® TOP + éthéphon
0,7 à 0,6 l/ha + 0,3 l/ha


En programme

MÉDAX® TOP
0,7 à 0,6 l/ha

éthéphon
0,3 l/ha

Sur triticale

Application unique



MÉDAX® TOP
0,8 l/ha

En programme


MÉDAX® TOP
0,8 à 0,6 l/ha

Ethéphon
0,5 à 0,3 l/ha

Sur seigle et avoine

Seigles

Application unique



MÉDAX® TOP
0,8 l/ha

En programme

Cycocel® C5
BASF : 2,5 l/ha

MÉDAX® TOP
0,8 à 0,6 l/ha

Avoines

MÉDAX® TOP
0,8 l/ha

Qu'est-ce que Médax® Top ?

- Autorisation de vente n° 2010030
- Composition : 50 g/l de prohexadione-Calcium + 300 g/l Mépiquat-chlorure
- Formulation : SC
- Usages et doses: limitation de la croissance des organes aériens : avoine d'hiver, avoine de printemps, blé dur d'hiver, blé tendre d'hiver, orge de printemps, seigle, triticale : (1l/ha)
Orge d'hiver : 1,5 l/ha

- Classement toxicologique : Xn : Nocif, R22 : Nocif en cas d'ingestion.
- Délai d'emploi avant récolte – DAR sur céréales: 56 jours
- Distance par rapport au point d'eau – ZNT : 5 mètres (cf arrêté du 21/9/06)
- Délai de rentrée : 6 heures (cf arrêté du 21/9/2006)