

FLASH INFO

Désherbage des céréales



Picotop®

Picotop®, votre nouvel anti-dicots, c'est :

- ★ un spectre très-large
- ★ utilisable sur les céréales d'hiver (BTH, OH, BDH, triticale, seigle)
- ★ un produit facilement associable avec votre anti-graminées*
- ★ 2 modes d'action originaux

Champ d'action de Picotop® à 2 L/ha

				TS (>95%)	S (85-94%)	MS (70-84%)	PS (50-70%)
Véro f. de lierre		Coquelicot					
Véronique agr.		Fumeterre					
Véronique de Perse		Gaillet					
Véronique des ch.		Stellaire					
Pensée		Géraniums					
		Sanve					
		Tabouret					
		Capselle					
		Colza repousses					
		Arabette de thallus					
		Ammi majus					
		Anthrisque					
		Carotte sauvage					
		Vesce					
		Lamiers					
		Sénéçon					
		Matricaires					
		Renouée des ois.					
		Myosotis					
		Bleuet					

Pour optimiser l'emploi de Picotop®

- ★ **Conditions d'emploi** : conditions minimales d'hygrométrie > 60%, températures douces > 5°C, évitez les périodes de gelées prolongées et les fortes amplitudes thermiques après traitement.
- ★ **Dose** : 2 L/ha seul ou 1,5 L/ha associé*
- ★ **Stade adventices** : plantules jusqu'à développées
- privilégier les stades jeunes
- ★ **Stade culture** : les applications doivent être réalisées du stade début tallage au stade 1er nœud. Pour bénéficier des meilleures conditions d'efficacité, nous recommandons d'appliquer Picotop® jusqu'au stade épi 1cm.

* nous consulter. Pour tout mélange, respecter la réglementation en vigueur et les guides de bonnes pratiques officiels.

Picotop®



Carte d'identité

- **Autorisation de vente n°** : 2120066 - ® marque déposée BASF
- **Composition** : 20g/L de picolinafen + 600g/L dichlorprop-p
- **Formulation et conditionnement** : SL (concentré soluble) - bidon de 10 L
- **Usages autorisés** : désherbage en blé tendre d'hiver - orge d'hiver - blé dur d'hiver - triticale - seigle d'hiver
- **Dose autorisée** : 2 L/ha
- **Doses pratiques recommandées** : 1,2 à 2 L/ha
- **Stades d'applications** : post-levée des céréales, uniquement sortie d'hiver/printemps, stade début tallage à épi 1 cm* (BBCH20-BBCH30).
- *Autorisé jusqu'au stade 1 nœud (BBCH31)
- **Classement toxicologique** : **Danger** 
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- **Zone non traitée par rapport aux points d'eau** : 20 mètres
- **Délai de rentrée dans la parcelle** : 24 heures après traitement
- **Nombre maximum d'applications par an** : une application tous les 2 ans**
- **Protection utilisateur lors de la préparation** : gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.

**Un dossier est en cours de dépôt pour la levée de restriction.

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION

-  **1** Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé. 
-  **2** Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi. 
-  **3** Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes). 
-  **4** Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application. 
-  **5** Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse). 
-  **6** Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor. 

PENDANT L'APPLICATION

-  **7** Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments. 

APRÈS L'APPLICATION

-  **8** Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle. 
-  **9** Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche. 
-  **10** Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande le procédé Osmofil® 
® Marque déposée SSI PANTEK France

Contacts utiles

Janvier 2013 Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Azur BASF Agro qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document. REF 780CEHE0113OUEST

BASF Agro S.A.S - 21, chemin de la sauvegarde - 69134 Ecully Cedex - tél : 04 72 32 45 45

Informations techniques Étiquettes et FDS	BASF Agro	N° Azur 0 810 02 30 33 ou www.basf-agro.fr
Une question de santé	MSA	Phytatititude N° Vert 0 800 887 887 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N° Azur 0810 12 18 85 ou www.adivalor.fr