

# **Flash FONGICIDE FORCE PRO**



**Ne jouez pas avec votre potentiel  
rendement- qualité!**

## Utilisez FORCE PRO – Le Fongicide haut de gamme

	BLE			ORGES			
	Oidium	Septo.	Rouille	Rhynco.	Oïdium	Rouille	Helmintho.
<b>Pyraclostrobine (F500)</b>	Red	Yellow	Green	Teal	Red	Green	Green
<b>Epoxiconazole (OPUS)</b>	Yellow	Green	Green	Green	Teal	Green	Teal
<b>Fenpropimorphe</b>	Teal	Red	Teal	Red	Green	Red	Red
<b>FORCE PRO (1/ 4,5 has)</b>	Teal	Green	Green	Green	Green	Green	Green

Un seul T2 complet pourra vous assurer

## **→ Curativité (septoriose et Rouilles)**

## Persistance

et **Polyvalence** sur un complexe maladie varié (Septoriose, Rouilles, Oidium...)



## Traiter avec 1 duo

# FORCE PRO / 4,5 has

## La strobilurine ( ) et la Triazole

[Feedback](#) | [Help](#)

## ) et la Triazole

**(Epoxiconazole) de référence associé au**

(Epoxyconazole) de référence associé au

# Fenpropimorphe



Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter la société **MEUNIER**



FORCE Pro est un bidon associatif contenant 1L de Comet® et 4 L de Player®.   
Comet® Autorisation de vente n° 2000232. Composition : 250 g/L de sucrose lactosérum. Formulation : Concentré. Émulsionnable ; EC.

**Comet®** Autorisation de vente n° 2000332, Composition: 250 g/l de pyraclostrobine Formulation : Concentrée Emulsionnable : EC - Dose homologuée sur céréales : 1L/ha  
 Usages : Blés : septoriose, rouilles jaune, rouille brune, fusariose des épis - Orge : helminthosporiose, rhynchosporiose, rouille naine - Avoine : rouille couronnée - Seigle : rouille brune - rhynchosporiose - Triticale : septoriose, rouille jaune, rouille brune - Classement toxicologique : Xn: Nocif - N : dangereux pour l'environnement - R20/22 : Nocif par inhalation et ingestion - R38: Irritant pour la peau - R50/53: Très toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme - Distance par rapport au point d'eau - ZNT : 20 m  
 Délai avant récolte - DAR : 35 jours - Délai de rentrée dans la parcelle : 24 heures (cf. Arrêté J.O du 21/09/2006) - Nombre maximum d'applications par an : 2 - Le port de protections individuelles est recommandé lors de l'ensemble des étapes de manipulation et d'application du produit. **Player®** : Composition: 84 g/l d'époxyconazole + 250 g/l de Fenpropimorph - Dose autorisée sur céréales : 1,5 L/ha - Autorisation de vente n°9800528 - Formulation : Suspension Concentrée : SC - Usages : Blés : septoriose, oïdium, rouilles jaune, rouille brune, fusariose des épis - Orge : helminthosporiose, rhynchosporiose, rouille naine, rouille jaune, oïdium - Avoine : rouille couronnée, oïdium - Seigle : rouille brune, rhynchosporiose - Triticale : septoriose, rouille brune - Classement toxicologique : - Xn: Nocif - AQUA : Dangereux pour les organismes aquatiques - R36/38: Irritant pour les yeux et la peau - R43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau - R40: Possibilité d'effets irréversibles - R62: Risque possible d'altération de la fertilité - R63: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant - Zone non traitée par rapport au point d'eau : 5 m (cf arrêté du 12/09/06) - DAR Céréales : 35 jours - Délai de rentrée dans la parcelle : 48 heures (cf Arrêté du 12/09/06) - **Comet®** : Utilisation autorisée exclusivement en mélange. Le port de protections individuelles est recommandé lors de l'ensemble des étapes de manipulation et d'application du produit.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI**