




The Chemical Company

FORKA® + Isard®

Le désherbage du Sorgho



Sur sorgho : le positionnement



Les conditions de la réussite :

- ✓ **Dès le stade 3 feuilles du sorgho,** sinon risque sélectivité
- ✓ **Avant 1 feuilles des graminées,** sinon baisse d'efficacité
- ✓ **Sol humide impératif** ou pluie (10mm dans les 10 jours) ou irrigation
- ✓ **Sol finement préparé**, sans grosse motte, débris ou détritus végétaux
- ✓ **En dehors de périodes de froid ou de pluies prolongées qui stressent la culture**

Sur sorgho : les doses

- Les doses de produit sont à moduler en fonction de la pression en graminées attendue :

Pression graminées faible	FORKA® 2 L/ha + ISARD® 1 L/ha
Pression graminées forte	FORKA® 2,5 L/ha + ISARD® 1,2 L/ha

Note : En cas de doses fortes, d'utilisation précoce ou de conditions environnementales défavorables, le sorgho traité avec FORKA® + Isard® peut présenter des symptômes visuels qui disparaissent lors de la croissance.

Sur sorgho : les cibles

- FORKA® + Isard® est efficace sur de nombreuses adventices, et en particulier sur :

■ Graminées

- Panic



- Sétaire



- Digitaire



■ Dicotylédones

- Amarante



- Renouée des oiseaux



- Chénopode



- Renouée liseron



- Matricaire



- Stellaire



- Morelle



- Véronique de Perse



Qu'est-ce que FORKA® + Isard® ?

FORKA® et Isard® : marques déposées BASF.

Autorisation de vente :

- FORKA : n°2040197
- Isard : n°9900251

Composition :

- FORKA® : pendiméthaline 400 g/L
- Isard® : dmta-p 720 g/L

Formulation :

- FORKA® : SC
- Isard® : EC

Classement toxicologique :

- FORKA® : N : dangereux pour l'environnement – R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques
- Isard® : Xn : nocif – AQUA : dangereux pour les organismes aquatiques – R22 : nocif en cas d'ingestion – R36 : irritant pour les yeux – R 43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

Usages et doses autorisées :

- FORKA® : maïs, sorgho 3 L/ha, nombreuses autres homologations
- Isard® : maïs grain et fourrage, maïs doux 1,4 L/ha, sorgho 1,2 L/ha

Nombre maximum de traitements / an :

- FORKA® : 1 application par saison maximum
- Isard® : 1 application par saison maximum

Délai avant récolte :

- FORKA® : DAR sorgho : 90 jours
- Isard® : DAR maïs et sorgho : 90 jours – DAR maïs doux : 60 jours

Distance aux points d'eau :

- FORKA® : respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 mètres
- Isard® : respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 mètres
(Cf. Arrêté J.O. du 21/09/2006)

Délai de rentrée :

- FORKA® : 6 heures
- Isard® : 48 heures
(Cf. Arrêté J.O. du 21/09/2006)

Protection utilisateur lors manipulation produit : **gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.**