

Maîtrise les graminées et les dicots dès la pré-levée des Maïs grain et fourrage



Une solution très large spectre, graminées et dicots

- Gère les levées échelonnées grâce à sa persistance d'action
- Dans la majorité des situations, satisfaction en 1 passage
- En cas de fortes pressions d'adventices, permet un désherbage raisonné en post-levée

	ATIC [®] AQUA (2 à 2,2 L/ha) + SPECTRUM [®] (1 à 1,2 L/ha)		ATIC [®] AQUA (2 à 2,2 L/ha) + SPECTRUM [®] (1 à 1,2 L/ha)		ATIC [®] AQUA (2 à 2,2 L/ha) + SPECTRUM [®] (1 à 1,2 L/ha)
GRAMINÉES ESTIVALES		DICOTYLÉDONES DIFFICILES		DICOTYLÉDONES DIVERSES	
Digitaires sp.		Ambrosie à f. d'Armoise		Capselle bourse-à-pasteur	
Panic pied-de-coq		Arroches sp.		Colza (repousses)	
Setaires sp.		Datura stramoine		Lamier pourpre	
AUTRES GRAMINÉES ANNUELLES		Fumeterre officinal		Matricaire camomille	
Paturin annuel		Gaillet gratteron		Mouron des champs	
Ray-grass d'Italie		Laiterons sp. (issus de graines)		Pourpier potager	
Vulpin		Linaires sp.		Ravenelle	
DICOTYLÉDONES CLASSIQUES		Mercuriale annuelle		Rumex sp. (issus de graines)	
Amarantes sp.		Pensée des champs		Sanve	
Chénopodes sp.		Renouée des oiseaux		Séneçon commun	
Morelle noire		Renouée liseron		Stellaire	
Renouée persicaire (et à f. de Patience)		Véroniques sp.			

Très sensible (TS)	> 95 %
Sensible (S)	85-95 %
Moyennement sensible (MS)	70-85 %
Peu sensible (PS)	50-70 %
Très peu sensible (TPS)	< 50 %

Un haut niveau d'efficacité sur des dicots parfois très difficiles à contrôler


- La renouée des oiseaux
- Les véroniques
- Les pensées
- Un effet frein sur liserons



Une formulation micro-encapsulée d'Atic[®] Aqua , pour plus de confort à l'utilisation

- Base aqueuse de la formulation → pas d'odeur
- Opérations de nettoyage facilitées
- Relargage progressif de la matière active → actif plus longtemps

Préconisations



	ATIC [®] Aqua – 5 L	Spectrum [®] – 3 L
1 Twin pour 2,5 ha	2 L/ha	1,2 L/ha
1 Twin pour 3 ha	1,7 L/ha	1 L/ha

Fiche d'identité

ATIC AQUA[®] : marque déposée BASF

Autorisation de vente : n°2090011

Composition : 455 g/L pendiméthaline

Formulation : encapsulée (CS)

Classement toxicologique :

N : dangereux pour l'environnement

R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

Usages et doses autorisées :

2,6 L/ha tournesol, maïs, sorgho, millet, moha, miscanthus

Nombre maximum de traitements / an :

1 application par saison maximum

Délai avant récolte :

DAR grain : 120 jours

DAR ensilage et fourrage vert : 90 jours

Distance aux points d'eau : respecter une zone non traitée (ZNT) de 20 mètres

Délai de rentrée : 6 heures



Spectrum[®] : marques déposées BASF

Autorisation de vente : n°9900251

Composition : 720 g/L de dmta-p

Formulation : EC

Classement toxicologique :

Xn : nocif – N : dangereux pour l'environnement

R22 : nocif en cas d'ingestion

R36/38 : irritant pour les yeux et pour la peau
R43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

Usages et doses autorisées : maïs grain et fourrage, maïs doux 1,4 L/ha, sorgho 1,2 L/ha

Nombre maximum de traitements / an :

1 application par saison maximum pour maïs et sorgho

Délai avant récolte :

DAR maïs et sorgho : 90 jours

DAR maïs doux : 60 jours

Distance aux points d'eau :

Respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 m

Délai de rentrée : 48 heures

Protection utilisateur lors manipulation produit : gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION	
1	Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
2	Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi.
3	Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
4	Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
5	Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
6	Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor.

PENDANT L'APPLICATION	
7	Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.

APRÈS L'APPLICATION

8	Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
9	Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
10	Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande le procédé Osmofil [®]

Contacts utiles

Informations techniques Étiquettes et FDS	BASF Agro	N°Azur 0 810 02 30 33 ou www.basf-agro.fr
Une question de santé	MSA	PhytAttitude N°Vert 0 800 887 887 APRIL SERVICE DESURVEILLANCE 24h/24
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	N°Azur 0 810 12 18 85 ou www.adivalor.fr