



Une solution très large spectre, graminées et dicots

- ATIC® Aqua + Spectrum® est efficace sur de nombreuses adventices, et en particulier sur :

■ Graminées

• Panic



• Sétaire



• Digitale



■ Dicotylédones

• Amarante



• Chénopode



• Matricaire



• Morelle



• Renouée des oiseaux



• Renouée liseron



• Stellaire



• Véronique de Perse



Une formulation micro-encapsulée d'Atic® Aqua , pour plus de confort à l'utilisation

- Base aqueuse de la formulation → pas d'odeur
- Opérations de nettoyage facilitées
- Relargage progressif de la matière active → actif plus longtemps


Simplification : des doses adaptées en fonction de la pression graminées

Pression graminées faible	ATIC® AQUA 1,7 L/ha + Spectrum® 1 L/ha	1 Twin pour 3 ha
Pression graminées forte	ATIC® AQUA 2 L/ha + Spectrum® 1,2 L/ha	1 Twin pour 2,5 ha

Note : En cas de doses fortes, d'utilisation précoce ou de conditions environnementales défavorables, le sorgho traité avec ATIC® Aqua + Spectrum® peut présenter des symptômes visuels qui disparaissent lors de la croissance.

Préconisations

semis germination levée



Les conditions de la réussite :

- **Dès le stade 3 feuilles du sorgho**, sinon risque sélectivité
- **Avant 1 feuilles des graminées**, sinon baisse d'efficacité
- **Sol humide impératif** ou pluie (10mm dans les 10 jours) ou irrigation
- **Sol finement préparé**, sans grosse motte, débris ou détritus végétaux
- **En dehors de périodes** de froid ou de pluies prolongées **qui stressent la culture**

Fiche d'identité

ATIC AQUA® : marque déposée BASF

Autorisation de vente : n°2090011

Composition : 455 g/L pendiméthaline

Formulation : encapsulée (CS)

Classement toxicologique :

N : dangereux pour l'environnement
R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

Usages et doses autorisées :

2,6 L/ha tournesol, maïs, sorgho, millet, moha, miscanthus

Nombre maximum de traitements / an :

1 application par saison maximum

Délai avant récolte :

DAR grain : 120 jours

DAR ensilage et fourrage vert : 90 jours

Distance aux points d'eau :

Respecter une zone non traitée (ZNT) de 20 mètres

Délai de rentrée :

6 heures



Spectrum® : marque déposée BASF

Autorisation de vente : n°9900251

Composition : 720 g/L de dmta-p

Formulation : EC

Classement toxicologique :

Xn : nocif – N : dangereux pour l'environnement
R22 : nocif en cas d'ingestion
R36/38 : irritant pour les yeux et pour la peau
R43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
R50/53 : très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

Usages et doses autorisées : maïs grain et fourrage, maïs doux 1,4 L/ha, sorgho 1,2 L/ha

Nombre maximum de traitements / an :

1 application par saison maximum pour maïs et sorgho

Délai avant récolte :

DAR maïs et sorgho : 90 jours

DAR maïs doux : 60 jours

Distance aux points d'eau :

Respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 m

Délai de rentrée :

48 heures

Protection utilisateur lors manipulation produit : **gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.**

10 gestes responsables et professionnels de la pulvérisation

AVANT L'APPLICATION

- 1 ▶ Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé. ✓
- 2 ▶ Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi. ✓
- 3 ▶ Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes). ✓
- 4 ▶ Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application. ✓
- 5 ▶ Surveiller le remplissage et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse). ✓
- 6 ▶ Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve et recycler dans le cadre des collectes Adivalor. ✓

PENDANT L'APPLICATION

- 7 ▶ Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent et éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments. ✓

APRÈS L'APPLICATION

- 8 ▶ Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle. ✓
- 9 ▶ Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche. ✓
- 10 ▶ Prévenir les pollutions ponctuelles : traitement des effluents phytosanitaires, BASF Agro recommande le procédé Osmofilm®. ✓

Contacts utiles

Informations techniques Etiquettes et FDS	BASF Agro	☎ N°Azur 0 810 02 30 33 ou www.basf-agro.fr
Une question de santé	MSA	PhytAttitude ☎ N°Vert 0 800 887 887 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF Agro	Service Sécurité 24h/24 01 49 64 57 33
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	☎ N°Azur 0810 12 18 85 ou www.adivalor.fr