

FORKA® + Isard®

Maîtrise les graminées et les dicots dès la pré-levée des Maïs grain et fourrage

Une solution très large spectre, graminées et dicots

- Gère les levées échelonnées grâce à sa persistance
- Dans la majorité des situations, satisfaction en 1 passage
- En cas de fortes pressions d'adventices, permet un désherbage raisonné en post-levée

Composition du TWIN FORKA® + Isard®

- FORKA® : 400 g/L pendiméthaline (SC) – AMM n° 2040197
- Isard® : 720 g/L de dmta-p (EC) – AMM n° 9900251

	FORKA®	Isard®	Ref. W / B
1 bidon Twin	5 Litres	2,4 Litres	
1 Twin / 2 ha	2,5 l / ha	1,2 l / ha	4 l / ha
1 carton = 2 Twin			
1 carton / 4 ha	2,5 l / ha	1,2 l / ha	4 l / ha
1 carton / 4,5 ha	2,25 l / ha	1,06 l / ha	3,6 l / ha
1 carton / 5 ha	2,0 l / ha	0,96 l / ha	3,2 l / ha

Un haut niveau d'efficacité sur des dicots parfois très difficiles à contrôler

- la renouée des oiseaux
- les véroniques
- les pensées
- un effet frein sur liserons




FORKA® + Isard®	
Graminées	
Digitaire sanguine	●
Panic dichotome	●
Panic faux-millet	●
Panic pied de coq	●
Pâturin annuel	●
Ray-grass	●
Sétaire glauque	●
Sétaire verte	●
Sétaire verticillée	●
Vulpin	●
Dicotylédones	
Amarante réfléchie	●
Amarante verte	●
Ambroisie à feuille d'armoise	●
Arroche étalée	●
Capselle	●
Chénopode blanc	●
Chénopode polysperme	●
Datura stramoine	●
Fumeterre officinale	●
Laiteron des champs	●
Linaire élatine	●
Matricaire camomille	●
Mercieriale annuelle	●
Morelle noire	●
Mouron des oiseaux	●
Mouron des champs	●
Pensée des champs	●
Phytolaque	●
Pourpier	●
Ravenelle	●
Renouée à feuille de patience	●
Renouée des oiseaux	●
Renouée liseron	●
Renouée persicaire	●
Sanve	●
Séneçon commun	●
Spergule des champs	●
Véronique de Perse	●
Efficacité :	
● > 95 %	● 70 à 85 %
● 85 à 95 %	● 50 à 70 %

Une solution qui permet la simplification

- Facile à positionner en pré-levée, juste après le semis
- Utilisable en post précoce

Comment s'utilise-t-il ?



Qu'est-ce que FORKA® + Isard® ?

FORKA® et Isard® : marques déposées BASF.

Autorisation de vente :

- FORKA : n°2040197
- Isard : n°9900251

Composition :

- FORKA® : 400 g/L pendiméthaline
- Isard® : 720 g/L de dmtp-p

Formulation :

- FORKA® : SC
- Isard® : EC

Classement toxicologique :

- FORKA® : N : dangereux pour l'environnement – R50/53 : très毒ique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques
- Isard® : Xn : nocif – AQUA : dangereux pour les organismes aquatiques – R22 : nocif en cas d'ingestion – R36 : irritant pour les yeux – R 43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

Usages et doses autorisées :

- FORKA® : sorgho 3 L/ha, nombreuses autres homologations
- Isard® : maïs grain et fourrage, maïs doux 1,4 L/ha, sorgho 1,2 L/ha

Nombre maximum de traitements / an :

- FORKA® : 1 application par saison maximum
- Isard® : 1 application par saison maximum

Délai avant récolte :

- FORKA® : DAR sorgho : 90 jours
- Isard® : DAR maïs et sorgho : 90 jours – DAR maïs doux : 60 jours

Distance aux points d'eau :

- FORKA® : respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 mètres
- Isard® : respecter une zone non traitée (ZNT) de 5 mètres
(Cf. Arrêté J.O. du 21/09/2006)

Délai de rentrée :

- FORKA® : 6 heures
- Isard® : 48 heures
(Cf. Arrêté J.O. du 21/09/2006)

Protection utilisateur lors manipulation produit : **gants en nitrile ou néoprène EN374, lunettes de sécurité, masque jetable de type P3, bottes de protection marquage S5 ou P5, vêtement de travail de niveau de protection 4.**