

# Grip® Top

pour une protection sereine de vos vignes

**1**

Efficace sur **feuilles et grappes**

**2**

Protège vos vignes jusqu'à **14 jours**

**3**

Régularité d'action en toute situation

**4**

Résistant au lessivage

**5**

Pratique et facile d'emploi : formulé en granulés dispersables



## PRECONISATIONS

- Mildiou ; Black-rot (uniquement en cas de lutte conjointe contre le mildiou) : **2,5 Kg/ha**
- Utilisation pendant **toute la période à risque mildiou**
- 2 applications maximum non consécutives par campagne**



## REGLEMENTATION

- DRE : **48 heures**
  - DAR : **35 jours**
  - ZNT aquatique et terrestre : **5 mètres**
- Association** possible avec les anti-oïdium (après vérification de la compatibilité réglementaire et physique)



## FICHE D'IDENTITE

**Grip® Top** : marque déposée BASF.

- **Autorisation de vente n°** : 2120132.
- **Composition** : 9% de diméthomorphe + 44% de métirame.
- **Formulation** : WG.
- **Classement toxicologique** :



Attention

**H302** : nocif en cas d'ingestion.

**H317** : peut provoquer une allergie cutanée.

**H373** : risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**H400** : très toxique pour les organismes aquatiques.

**H410** : très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- **Limite maximale de résidus** :

**Raisin, diméthomorphe** : 3 mg/kg.

**Raisin, métirame** : 5 mg/kg.

Usages	Doses	Nombre maximum d'applications par campagne	Délai d'emploi avant récolte (DAR)	Zone non traitée aquatique et zone non cultivée adjacente (arthropodes) (ZNT)	Délai de rentrée (DRE)
<b>Vigne, mildiou, black-rot</b> (uniquement en cas de lutte conjointe contre le mildiou)	2,5 Kg/ha	2 non consécutives  Black-rot : BBCH 15 - 83	35 jours	5 mètres	48 heures

**Protection de l'utilisateur lors de la préparation de la bouillie** : gants en nitrile certifiés EN 374-3, EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065, EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison de travail.

### Contacts utiles

Informations techniques Étiquettes et FDS	BASF France - Agro	0 800 100 299 <small>Service &amp; appel gratuits</small>	ou <a href="http://www.agro.bASF.fr">www.agro.bASF.fr</a>
Une question de santé	MSA	<b>Phyt'attitude</b>	N° Vert 0 800 887 887 <small>APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE</small>
En cas d'urgence (incident ou accident)	BASF France - Agro	Service Sécurité 24h/24 : 01 49 64 57 33	
Collecte des emballages vides	ADIVALOR	<a href="http://www.adivalor.fr">www.adivalor.fr</a>	

Mars 2019 - 510VIME0319EST.®Marque déposée BASF. Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute application, auprès du N° Vert BASF (0800100299) qu'il dispose bien de la dernière version à jour de ce document.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou consulter [www.agro.bASF.fr](http://www.agro.bASF.fr) et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com).